



CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

ENFERMAGEM

21. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) defende que o fortalecimento do SUS está ancorado, dentre outros fatores, no reconhecimento e na autonomia da enfermagem como força de trabalho essencial e indispensável para atender às demandas de saúde dos usuários. Nesse sentido, considera a Enfermagem de Prática Avançada (EPA) como força potente para essa finalidade.

Portanto, acerca da EPA no contexto brasileiro, analise as asserções abaixo e assinale o único item CORRETO:

- A) *O International Council of Nurses (ICN) define o enfermeiro de prática avançada como: profissional licenciado, que adquiriu título de especialista - compatível, no Brasil, à modalidade lato sensu de formação -; com habilidades para tomada de decisões complexas e competências clínicas para uma prática ampliada.*
- B) *No Brasil, ainda não há regulamentação para a EPA. Contudo, observa-se nos países da América Latina que os enfermeiros desempenham ações cada vez mais complexas, tornando evidente o potencial para ampliação do seu escopo de prática.*
- C) *A Organização Panamericana de Saúde (OPAS/OMS) defende que a EPA no Brasil deve ser centrada para a atenção primária à saúde (APS), buscando aumentar o escopo de práticas do enfermeiro, restringindo aspectos do trabalho multiprofissional e interprofissional em saúde, que podem impactar na autonomia da enfermagem.*
- D) *Para uma implementação efetiva da EPA, é defendida pelo Cofen a possibilidade da formação por Educação à Distância (EaD) de enfermeiros e de técnicos de Enfermagem, resguardando a qualidade dos cursos ofertados na modalidade 100*
- E) *No Brasil, alguns pontos do cenário atual que favorecem o desenvolvimento regulamentado da EPA são: definição clara acerca do escopo de prática profissional para a EPA (excetuando-se possibilidade de prescrições e diagnósticos clínicos), existência de legislações relacionadas à prática profissional e a articulação entre a atenção primária e os demais níveis de saúde.*

22. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) Reconhecendo a necessidade, enquanto categoria, em nos apropriarmos acerca do conteúdo da Lei 14.434/2022, que versa sobre o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parreira, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. *A lei estabelece o Piso Salarial de R\$4.750 para enfermeiros. Para técnicos de Enfermagem, o salário não pode ser inferior a 70% deste valor, ou seja, R\$3.325. Já os auxiliares e as parreiras não podem receber menos que a metade do piso pago aos enfermeiros.*
 - II. *Os trabalhadores de cooperativas têm direito ao piso, considerando que a Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao salário-mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas.*
 - III. *Com relação aos profissionais de enfermagem aposentados, tendo em vista que podem ser enquadrados em diversas regras, acarretando, inclusive, remuneração diferenciada daqueles que estão em atividade, não se pode afirmar, categoricamente, que todos os profissionais de Enfermagem aposentados deverão receber, no mínimo, o valor do piso.*
 - IV. *O piso pode ser aplicado aos professores. Entretanto, será necessário verificar cada contrato de trabalho, e observar se as referidas atividades são para o exercício exclusivo do magistério, caso em que não haverá a aplicação do piso, ou se serão prestados serviços de enfermagem, situação em que o piso incidirá.*
- A) *As declarações dos itens I, II, III e IV são verdadeiras.*
 - B) *As declarações dos itens I, II, III e IV são falsas.*
 - C) *Somente a declaração do item I é verdadeira.*
 - D) *Somente as declarações dos itens I, II e IV são verdadeiras.*
 - E) *Somente as declarações dos itens II e III são verdadeiras.*

23. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) Em 12 de junho de 2018 foi instituída a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), por meio da Resolução n. 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Sobre a PNVS e a atuação do enfermeiro, analise os itens abaixo e julgue-os em Verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa CORRETA.

- () *Entende-se por Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças.*
- () *A PNVS compreende a articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária e alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde-doença.*



() São diretrizes da PNVS, dentre outras: conhecimento do território para a definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de recursos e orientação programática; participação da comunidade de forma a ampliar sua autonomia, emancipação e envolvimento na construção da consciência sanitária e garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em Saúde.

() Embora o profissional enfermeiro não atue, efetivamente, na elaboração de programas de ação para o controle de riscos, agravos e doenças, as ações do enfermeiro, na perspectiva das atividades com foco para a vigilância em saúde, englobam: coletar, processar e analisar informações básicas necessárias ao controle de condições que representem risco à saúde pública; supervisionar a população sob risco, através da assistência de enfermagem e participar de pesquisas epidemiológicas.

- A) V-V-V-F.
- B) V-V-F-V.
- C) V-V-F-F.
- D) V-V-V-V.
- E) F-F-F-F.

24. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) O objetivo da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) é promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL, 2006).

Assim, são diretrizes da PNPS, EXCETO:

- A) Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da qualidade de vida e de saúde.
- B) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.
- C) Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança das ações prestadas.
- D) Divulgar e informar das iniciativas voltadas para a promoção da saúde para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias participativas e o saber popular e tradicional.
- E) Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.

25. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022)

Leia o trecho abaixo:

Independentemente do tipo de ambiente que você, eventualmente, escolhe para trabalhar como um enfermeiro de equipe, você será responsável pela utilização dos recursos organizacionais, na participação em rotinas organizacionais, em proporcionar cuidados diretos ao paciente, usando o tempo de forma produtiva com definição de prioridades, colaborando com todos os membros da equipe de saúde e usando certas competências de liderança para gerenciar outros membros da equipe de enfermagem. (POTTER; PERRY, 2021, p. 276).

Desse modo, tomando por base o trecho citado acima, analise as asserções sobre o gerenciamento dos cuidados de enfermagem, assinalando a única alternativa CORRETA.

- A) O enfermeiro gerente que usa a liderança transformacional é focado na mudança e na inovação, por meio do desenvolvimento da equipe, motivando e capacitando os funcionários em um modelo de tomada de decisões verticalizadas, uma vez que tal profissional é considerado um modelo para a equipe, experiente e competente em todos os aspectos da prestação de cuidados e sabe delegar atividades adequadamente.
- B) Modelos efetivos de liderança da enfermagem envolvem fortalecimento estrutural, novos conhecimentos, inovação e melhorias e qualidade empírica dos resultados. Embora tais aspectos não impactem na autonomia profissional do enfermeiro e no controle sobre o ambiente de trabalho, tornam possível gerar dados acerca da prática baseada em evidências.
- C) O gerenciamento do cuidado envolve a adoção de um modelo de prestação de cuidados ao paciente. O modelo mais comum é o modelo centrado no paciente e na família, sendo esse o modelo original de prestação de cuidados desenvolvido por Florence Nightingale, no qual são formadas parcerias mútuas entre o paciente, a família e a equipe de saúde.
- D) O enfermeiro gerente reconhece que a colaboração interprofissional é fundamental para o provimento de cuidados de qualidade. As competências necessárias para uma colaboração interpessoal eficaz incluem: trabalhar com pessoas de outras profissões com respeito mútuo e usar o conhecimento do próprio papel e das outras profissões para cuidar, de forma adequada, das necessidades dos cuidados de saúde dos pacientes.
- E) São responsabilidades do Enfermeiro Gerente: definir as metas anuais para a unidade; monitorar padrões profissionais de prática de enfermagem na unidade; recrutar novos funcionários; realizar avaliações de rotina; encaminhar reclamações e resoluções de conflitos para o superior imediato; analisar



e recomendar novos equipamentos para a unidade e realizar reuniões regulares.

26. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) "A cobertura vacinal da população vem despencando [...] chegando em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados. Em 2020, o índice era de 67% e em 2019, de 73%. O patamar preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%." (Fiocruz, 2022).

Com relação aos dados apresentados, analise as asserções abaixo, e assinale a relação correta entre as sentenças:

I. A hesitação vacinal pode ser definida como o atraso em aceitar ou a recusa deliberada das vacinas recomendadas. É um fenômeno comportamental complexo e envolve aspectos culturais, sociais e econômicos [...] esse comportamento pode ser influenciado por múltiplos fatores, como a confiança, a complacência e a conveniência. A confiança versa sobre a eficácia e a segurança das vacinas, o sistema de saúde e as motivações dos gestores. A complacência resulta da baixa percepção de risco de contrair a doença. Por fim, a conveniência considera a disponibilidade física, acessibilidade e acesso à informação em saúde.

PORTANTO

II. Além de identificar e compreender o fenômeno, torna-se relevante traçar estratégias que englobem um conjunto de intervenções eficazes, buscando combater a hesitação vacinal. De forma geral, é importante aumentar o conhecimento da população, otimizando estratégias de comunicação, criação de mídias, mobilização social e uso de instrumentos informativos para profissionais de saúde. Além disso, podem ser eficazes estratégias de incentivos não financeiros, de agendamento e de convocação para vacinação direcionadas à população-alvo.

- A) As asserções I e II são proposições falsas.
- B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
- C) A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira.
- D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento coerente para a I.
- E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento coerente para a I.

27. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) O Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. No total, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas. São vacinas de rotina no Calendário de Vacinação do Adolescente (2022/2023), segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm):

- A) HPV - Influenza - Meningocócica conjugada ACWY ou C.
- B) HPV -Tríplice bacteriana - Tríplice viral.
- C) Meningocócica conjugada ACWY ou C- Dengue - Febre amarela.
- D) Hepatite B - Varicela - Tríplice viral.
- E) Meningocócica B - Dupla Adulto - Hepatite A.

28. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) O programa Previnde Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em quatro critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo para ações estratégicas e incentivo financeiro com base em critério populacional (BRASIL, 2023). Sobre o indicador "proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite Inativada."(Nota Técnica Nº 22/2022), assinale a única alternativa CORRETA.

- I. O indicador é constituído por variáveis relacionadas ao processo de cuidado da criança na APS, especialmente no tocante à administração das doses de vacina contra Pólio e Penta que são recomendadas pelo PNI.
 - II. Se espera que além, da administração das vacinas, seja fornecido cuidado integral com ações de orientação ao aleitamento materno, acompanhamento familiar e identificação precoce dos agravos.
 - III. Boas práticas de registros de informação nos sistemas de informação em saúde são fundamentais para o sucesso das ações de monitoramento e avaliação dos indicadores. A qualidade do registro de informação pressupõe registro diário e, preferencialmente, durante o contato assistencial.
 - IV. É uma recomendação para melhorar os resultados do indicador: Realizar captação das crianças logo após o nascimento, de preferência, no momento do teste do pezinho e/ou consulta puerperal, marcando a primeira consulta de puericultura para a primeira semana de vida.
- A) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras.
 - B) Somente a alternativa I é falsa.
 - C) Somente as alternativas I e II são falsas.
 - D) As alternativas I, II, III e IV são verdadeiras.
 - E) As alternativas I, II, III e IV são falsas.



29. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) Situações referentes ao campo da saúde mental estão entre aquelas que mais exigem esforço da equipe para a percepção oportuna do problema e a tomada de decisão (BRASIL, 2013). No que diz respeito à atenção em saúde mental no atendimento à demanda espontânea nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), analise as sentenças abaixo, assinalando a única CORRETA.

- A) Muitas vezes, a queixa do usuário não está expressa claramente, ou é mascarada por sintomas somáticos, e somente será revelada por meio de escuta atenta. Espera-se que essa escuta ativa seja feita pelo enfermeiro da equipe, sendo esse o profissional designado nas unidades básicas de saúde para o primeiro contato com o usuário.
- B) O enfermeiro deve estar preparado para avaliar o problema adequadamente, evitando um constante adiamento em trazer à tona o tema do sofrimento psíquico, embora exista uma tendência em supervalorizar estas queixas em relações aos riscos expressamente biológicos.
- C) O enfermeiro precisa estar preparado para lidar com atitudes inadequadas ou de agressividade por parte de usuários com transtornos mentais, esse tipo de comportamento pode gerar insegurança entre profissionais de saúde e alimentar estereótipos. Assim, preparar a equipe para identificação, manejo das situações mais agudas e discussão de casos, torna a assistência mais resolutiva, possibilitando a capacitação dos profissionais para lidar com aspectos mais desafiadores da assistência.
- D) No fluxograma para atendimento com classificação de risco/vulnerabilidade dos pacientes com sofrimento mental agudo em UBS, o usuário que apresenta agressividade, agitação psicomotora, alteração do nível de consciência, confusão mental e/ou episódio convulsivo, requer atendimento prioritário na UBS, devendo ser avaliado pelo enfermeiro e classificado com a cor amarela.
- E) No fluxograma para atendimento com classificação de risco/vulnerabilidade dos pacientes com sofrimento mental agudo em UBS, o usuário que apresenta sinais de embriaguez ou intoxicação por uso de substâncias, tremores, tontura, choro inconsolável e/ou palpitações, deve ter atendimento no mesmo dia, sendo classificado com a cor verde.

30. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) No Brasil, dentre os diferentes sistemas de triagem aplicados em serviços de emergência, o Manchester Triage System (MTS) destaca-se por sua larga aplicação nas instituições hospitalares. O MTS é baseado na identificação da queixa principal do paciente e estabelece, através de fluxogramas de decisão e discriminadores, o tempo de espera máximo para a primeira avaliação médica. Desse modo, reconhecendo a importância do MTS no contexto da reorganização dos fluxos de atendimento nas instituições hospitalares e o protagonismo do enfermeiro na aplicação do referido protocolo, acerca de alguns dos seus discriminadores gerais, assinale a única opção CORRETA.

- I. O discriminador geral Risco à Vida sempre indicará um atendimento com nível de prioridade 1, caracterizado pela cor VERMELHA.
 - II. O discriminador geral Dor, quando for de intensidade severa, conduzirá a uma classificação com nível de prioridade 2, caracterizada pela cor LARANJA.
 - III. O discriminador geral Temperatura, quando $> 41^{\circ}\text{C}$, conduzirá a uma classificação com nível de prioridade 1, caracterizada pela cor VERMELHA.
 - IV. O discriminador geral Consciência, quando o usuário apresenta "nível de consciência alterado", conduzirá a uma classificação com nível de prioridade 3, caracterizada pela cor AMARELA.
 - V. O discriminador geral Hemorragia, quando o usuário apresentar uma grande hemorragia incontrolável, conduzirá a uma classificação com nível de prioridade 0, caracterizada pela cor VERMELHA.
- A) Somente as proposições II, IV e V são falsas.
 - B) Somente as proposições I e II são verdadeiras.
 - C) Somente as proposições III e IV são verdadeiras.
 - D) Somente as proposições I, II e III são verdadeiras.
 - E) Somente a proposição V é verdadeira.

31. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022)

Texto para as questões 31 e 32

O Enfermeiro é referência na equipe de saúde no que tange à prevenção e ao tratamento de feridas. Nesse sentido, deve expressar conhecimentos acerca da fisiologia, da cicatrização, dos fatores de risco, das etapas do processo de reparo tissular, bem como dos produtos disponíveis no mercado para o manejo de feridas agudas e crônicas. Nesse sentido, analise as alternativas abaixo e assinale a única sentença CORRETA:

- A) As feridas agudas são causadas por traumas e incisões cirúrgicas. Espera-se encontrar bordas limpas e intactas, com processo de cicatrização por segunda intenção.
- B) As feridas crônicas resultam de comprometimento vascular, inflamação crônica ou insultos repetitivos aos tecidos, a exposição continuada ao insulto dificulta a cicatrização, que deveria ocorrer por primeira intenção.
- C) O processo de cicatrização por intenção terciária é característico de quadros de feridas contaminadas, no qual o fechamento da ferida é adiado até a resolução do risco da infecção.
- D) A deiscência é uma complicação no processo de cicatrização de feridas e é caracterizada pela separação total das camadas da ferida, com a protusão de órgãos viscerais, sendo uma condição de emergência, que requer um reparo cirúrgico.



E) A Escala de Braden é um importante instrumento utilizado pelo enfermeiro para prever o risco de lesão por pressão e sua aplicação está ancorada na observação de apenas quatro aspectos interrelacionados: umidade; mobilidade; nutrição e atrito/cisalhamento.

32. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) Sobre as coberturas para o tratamento de feridas, analise as proposições abaixo e julgue-as em Certo (C) ou Errado (E) e assinale a sequência CORRETA.

- () O hidrogel é indicado para o tratamento de feridas fétidas, infectadas e com alta exsudação.
- () A colagenase é utilizada para o desbridamento enzimático de tecido necrosado.
- () O carvão ativado com prata deve ser utilizado em feridas decorrentes de queimaduras.
- () O hidrocoloide pode ser indicado para feridas crônicas pouco ou não exsudativas.

- A) C-C-C-C.
- B) E-E-E-E.
- C) C-C-E-C.
- D) E-C-E-C.
- E) E-E-E-E.

33. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) A maioria das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) poderia ser assistida pelas equipes de Saúde da Família. Destaca-se que o enfermeiro, como membro da equipe, deve conhecer os procedimentos para prevenção, manutenção do tratamento, estratificação de risco, reconhecimento e manejo das exacerbações da DPOC (BRASIL, 2010).

Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), assinale a única opção CORRETA.

- A) Na DPOC a limitação ao fluxo aéreo é progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, causando dispneia, tosse e produção de escarro mucopurulento. Essa limitação do fluxo de ar é totalmente reversível pelo uso de broncodilatadores, base do tratamento farmacológico da doença.
- B) A DPOC engloba uma gama de doenças que estão presentes na Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, pela Portaria Nº 221/2008, tais como: enfisema pulmonar, bronquite crônica, fibrose cística, bronquiectasia e asma brônquica.

C) São alguns fatores de risco para a DPOC: Exposição ocupacional a poeiras e produtos químicos ocupacionais (responsável por 80 a 90% das causas determináveis da DPOC); poluição domiciliar (fumaça de lenha, querosene); infecções respiratórias recorrentes na infância e tabagismo.

D) A educação em saúde tem importante papel na cessação do tabagismo e constitui uma das ações realizadas pelas equipes de Saúde da Família, além disso, o enfermeiro deve orientar os usuários acerca do tratamento farmacológico, que pode incluir: tratamento regular com corticoides sistêmicos para usuários com DPOC moderada e muitas exacerbações.

E) As medidas não-farmacológicas para manejo da DPOC podem incluir: abordagem psicossocial, nutricional e prática de exercícios físicos. Os pacientes com DPOC se beneficiam de programas de atividade física para aumentar a tolerância ao exercício e melhorar os sintomas de fadiga e dispneia.

34. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) A principal meta do tratamento do diabetes consiste em normalizar a atividade da insulina e os níveis de glicemia para reduzir o desenvolvimento de complicações. Assim, de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2022), julgue os itens abaixo e assinale a opção CORRETA.

- I. Deve ser considerada como meta de glicemia capilar em jejum, glicemia entre 80-130 mg/dL.
- II. Deve ser considerada como meta de glicemia capilar 2 horas após o início das refeições, < 180 mg/dL.
- III. Em idosos com DM uma meta de HbA1c < 8,5% deve ser considerada quando houver síndrome de fragilidade, presença de comorbidades e limitação cognitiva.

- A) As proposições I, II e III são verdadeiras.
- B) As proposições I, II e III são falsas.
- C) Somente a proposição I é verdadeira.
- D) Somente as proposições I e III são verdadeiras.
- E) Somente a proposição II é verdadeira.

35. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) As Doenças Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte nas Américas, e a Hipertensão Arterial (HA) é responsável por mais de 50% das DCV. Infelizmente [...] tanto o diagnóstico, quanto o tratamento e o controle têm sido ineficazes (OPAS, 2022). Sobre diagnóstico, controle e tratamento da HA, com base na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2020), julgue os itens abaixo e assinale a única alternativa INCORRETA.

- A) A Definição de HA, de acordo com a pressão arterial de consultório, é de pressão arterial sistólica (PAS) (mmHg) > 140 e/ou pressão arterial diastólica (PAD) (mmHg) > 90.



- B) O tratamento da hipertensão nos indivíduos diabéticos deve procurar manter valores < 120/70 (mmHg), evitando-se um aumento acentuado da PA para valores superiores a 130/80 mmHg.
- C) Para medida da PA, o manguito deve ser posicionado ao nível do coração, com a palma da mão voltada para cima, as roupas não devem garrotear o braço. O paciente deve estar com as costas e o antebraço apoiados; as pernas, des cruzadas; e os pés, apoiados no chão.
- D) PA elevada, tabagismo, obesidade, dieta não saudável e atividade física insuficiente são fatores de risco cardiovasculares estabelecidos e alvos de intervenções para controle da HA.
- E) As classes de anti-hipertensivos preferenciais para o controle da PA em monoterapia inicial são: diuréticos tiazídicos ou similares; bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores de receptores da angiotensina.

36. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) Os povos indígenas constituem-se como importante força social na disputa para influenciar as políticas públicas, em especial no que tange ao acesso aos serviços de saúde. Acerca da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (BRASIL, 2002), condições de saúde indígenas e atuação da enfermagem, assinale a única alternativa INCORRETA.

- A) Em relação à morbidade, verifica-se uma alta incidência de infecções respiratórias e gastrointestinais agudas, malária, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, desnutrição e doenças preveníveis por vacinas.
- B) Em algumas regiões, onde a população indígena tem relacionamento mais estreito com a população regional, nota-se o aparecimento de novos problemas de saúde relacionados às mudanças introduzidas no seu modo de vida, tais como: hipertensão arterial, diabetes, câncer, alcoolismo, depressão e suicídio.
- C) São diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena: monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas; articulação dos sistemas convencionais de saúde para melhor resolução das demandas; promoção do uso adequado e racional de medicamentos e promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde.
- D) A definição territorial dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) deve levar em consideração: perfil epidemiológico, acesso aos serviços instalados em nível local e à rede regional do SUS; relações sociais entre os diferentes povos indígenas do território, a sociedade regional e a distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas.
- E) Para a atuação do enfermeiro em saúde indígena é essencial a compreensão do processo saúde-doença de forma ampliada, incluindo o aspecto étnico-cultural. Trabalhar com o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais, por exemplo,

pode contribuir para a eficácia das ações, pois favorece o estreitamento da relação com os indígenas, o fortalecimento da cultura dessas populações e possibilita resgatar o saber tradicional.

37. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo *T. vaginalis* (protozoário flagelado), tendo como reservatório o colo uterino, a vagina e a uretra. Sobre a tricomoníase e as ações da enfermagem, com base no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (BRASIL, 2022), julgue as sentenças abaixo em certo (C) e errado (E) e assinale a sequência CORRETA.

- () Informações importantes que o enfermeiro deve coletar durante a anamnese envolvem: avaliar práticas sexuais, fatores de risco para IST, data da última menstruação, práticas de higiene vaginal e uso de medicamentos tópicos ou sistêmicos, com potencial para irritação local.
- () São manifestações clínicas características da tricomoníase o aparecimento de lesões papilares que, ao se fundirem, formam massas vegetantes de tamanhos variáveis, com aspecto de couve-flor.
- () O enfermeiro deve reconhecer os protocolos atuais para manejo da tricomoníase, que tem como fármacos de 1ª linha: Ceftriaxona 500mg (IM), dose única e Azitromicina 500mg (VO), 2 comprimidos, dose única.
- () São condutas do enfermeiro para a abordagem da tricomoníase: realizar orientação centrada na pessoa; contribuir para que a pessoa reconheça e minimize o próprio risco; tratar, acompanhar e orientar a pessoa e suas parcerias sexuais e realizar o preenchimento da ficha de notificação compulsória.
- A) E-E-C-C.
B) E-E-C-E.
C) C-E-E-C.
D) C-E-E-E.
E) C-C-E-C.

38. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) Leia o trecho abaixo:

Ao se comparar com a dengue, a Chikungunya apresenta características que amplificam a disseminação da doença [...] A inclusão da doença entre os diagnósticos clínicos diferenciais de síndrome dengue-like (doenças próximas à dengue) implica em intensa divulgação do agravo entre as equipes de saúde em todo o Brasil (DONALISIO; FREITAS, 2015, pg. 284).

Sobre as características da febre chikungunya, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:



- A) Destaca-se que a doença pode evoluir em três fases: febril ou aguda (duração de 5 a 14 dias); pós-aguda (até 3 meses) e crônica (se os sintomas persistirem por mais de 3 meses após o início da doença).
- B) São sintomas comuns da doença: febre; artralgia, lombalgia, mialgia, exantemas, cefaleia, diarreia e dor abdominal, parestias, retinites, arritmias, dermatoses e nefrite intersticial.
- C) O tratamento da febre chikungunya é feito de acordo com os sintomas. Até o momento, não há tratamento antiviral específico para a doença. A terapia utilizada é analgesia e suporte.
- D) São critérios para definir casos suspeitos: febre de início súbito > 38,5°C, artralgia ou artrite intensa de início agudo não explicado por outras condições, residente (ou que tenha visitado) em áreas com transmissão até duas semanas antes de começar os sintomas.
- E) Algumas limitações sobre a atuação dos enfermeiros e dos demais profissionais da equipe no controle da febre chikungunya diz respeito ao emprego de ações meramente assistencialistas, típicas das práticas campanhistas/higienistas. Além disso, embora sejam utilizados panfletos, palestras e orientações nas campanhas e nas visitas domiciliares, geralmente, são ações pontuais, realizadas somente quando há surtos das doenças.

39. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) Sobre a evolução da COVID-19, doença causada pelo Sars-CoV-2, a OMS destaca que "[...] a maioria (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Cerca de 15% fica gravemente doente e necessita de oxigênio e 5% fica gravemente doente e precisa de cuidados intensivos"(OMS, 2022). Acerca do manejo do paciente com necessidade de hospitalização e suporte de oxigênio, de acordo com fluxograma para avaliar envolvimento respiratório da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE, 2021), para um paciente com $SpO_2 < 92\%$ em ar ambiente (sem sinais claros de fadiga ou risco iminente de parada respiratória) deve-se considerar o uso de:

- A) Cateter nasal de O₂.
- B) Máscara com reservatório.
- C) Cateter nasal de alto fluxo.
- D) Máscara oronasal ou facial total.
- E) Cânula endotraqueal.

40. (RESIDÊNCIAS/ URCA 03/2022) Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença

que ameace a vida (BRASIL, 2018). Nesse contexto, sobre a Resolução n° 41/18 (Ministério da Saúde), que normatiza a oferta de cuidados paliativos como parte dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e a atuação do enfermeiro nesse contexto do cuidado, analise as sentenças abaixo e assinale a única alternativa CORRETA.

- I. São princípios norteadores para a organização dos cuidados paliativos: respeito à autodeterminação do indivíduo e promoção da livre manifestação de preferências para tratamento médico através de diretiva antecipada de vontade (DAV).
- II. No que tange à oferta dos cuidados paliativos na atenção hospitalar, destaca-se que deve ser voltada para o controle de sintomas que não sejam passíveis de manejo em outro nível de assistência.
- III. A Resolução Cofen 570/2018 identifica os Cuidados Paliativos como uma especialidade da Enfermagem.
- IV. No atual Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem consta que, nos casos de doenças graves incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, o enfermeiro deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.
- A) Somente as sentenças I e IV estão corretas.
- B) Somente a sentença III está incorreta.
- C) Somente as sentenças III e IV estão incorretas.
- D) As sentenças I, II, III e IV estão incorretas.
- E) As sentenças I, II, III e IV estão corretas.