



**ENFERMEIRO**

**31. (CONCURSO CRATO/2021) A incidência para câncer de mama aumenta gradativamente com o fator idade, em uma razão 15 vezes maior em mulheres acima de 70 anos. Em face disso, elevam o risco também, para essa neoplasia, fatores como:**

- A) Menopausa tardia (> 45 anos) e menarca precoce (< 14 anos).
- B) Nuliparidade e tabagismo.
- C) Etilismo continuado e menopausa precoce (< 50 anos).
- D) Idade do primeiro parto (> 35 anos) e nuliparidade.
- E) Síndrome metabólica e multigestação.

**32. (CONCURSO CRATO/2021) A sífilis representa um grande desafio para a saúde pública, em especial, em países como o Brasil. sendo responsável por uma série de desfechos desfavoráveis, particularmente, quando acomete à mulher no período gestacional, pelas graves repercussões que a mesma pode causar à saúde perinatal. Em relação as condutas padronizadas para o manejo adequado da sífilis, é correto afirmar:**

- A) O tratamento de escolha para os casos de sífilis primária é a azitromicina 1g, VO, por semana, durante 2 ou 3 semanas.
- B) Doxíciclina 100mg, 12h em 12h, VO, durante 14 dias, é o tratamento mais aceito para a sífilis com mais de 1 ano de acometimento na gestação.
- C) Para a sífilis recente, a pesquisa do treponema por bacterioscopia em campo escuro, ainda é o padrão-ouro para o diagnóstico laboratorial.
- D) Para as gestantes, é proscrito o uso de penicilina G benzatina, sendo indicado o uso de estolato de eritromicina.
- E) Na sífilis recente, a melhor abordagem terapêutica é a penicilina G benzatina, 1.200.000UI na região glútea, em dose única.

**33. (CONCURSO CRATO/2021) As síndromes hipertensivas na gestação estão entre as principais causas de morbidade materna grave e mortalidade materna. São responsáveis por cerca de 25% das mortes maternas na América Latina. A implementação de protocolos clínicos para condução adequada de casos é particularmente necessário como estratégia para a diminuição das mortes decorrentes da eclampsia, por exemplo. Analise as afirmações abaixo e opte pela assertiva correta:**

- A) O sulfato de magnésio é o fármaco de escolha tanto para a prevenção quanto para o tratamento das crises convulsivas da eclampsia.
- B) A iminência de eclampsia, condição associada a sinais e sintomas que podem predizer agravamento do quadro clínico das gestantes, não representa uma indicação para o uso do sulfato de magnésio.
- C) O sulfato de magnésio é fármaco reservado ao uso em ambiente intra-hospitalar, exclusivamente.
- D) Para o controle pressórico de grávidas com iminência de eclampsia, apenas o uso do sulfato de magnésio endovenoso, é suficiente, não sendo necessário o emprego de outras drogas com ação anti-hipertensiva.
- E) A ocorrência de eclampsia não infere na interrupção da gestação, a conduta expectante pode ser adotada com segurança.

**34. (CONCURSO CRATO/2021) O planejamento reprodutivo é compreendido como um direito sexual e reprodutivo e deve levar em consideração o contexto individual de decisão livre e informada sem discriminação ou qualquer tipo de violência. Em relação ao uso do Dispositivo intra-uterino (DIU), está INCORRETO afirmar:**

- A) O progestogênio presente no DIU liberador de levonorgestrel (DIU-LNG) causa modificações no muco cervical e na tuba uterina, dificultando a migração espermática e inibindo a fertilização.
- B) O cobre presente no DIU-Cu é tóxico para o espermatozoide, alterando sua motilidade e sua capacidade de penetrar no óvulo, impedindo, assim, a ocorrência da fecundação.
- C) Mulheres com câncer de mama atual são consideradas de categoria 4 (risco de saúde inaceitável caso o método anticoncepcional seja utilizado) pela OMS para uso dos DIU.



- D) O DIU pode ser inserido em qualquer momento do ciclo menstrual, sendo que na certeza de que a mulher não está grávida, não é necessário realizar teste de gravidez.
- E) O DIU-cobre necessita de método anticoncepcional adicional após sua inserção, pelo menos um mês após ser inserido.
- 35. (CONCURSO CRATO/2021) O papilomavírus humano (HPV) é comprovadamente o agente causador do câncer do colo do útero em 99% dos casos. Entretanto, alguns cofatores são considerados para a sua ocorrência, podendo-se considerar:**
- A) Nuliparidade.
- B) Uso abusivo de álcool.
- C) Uso de contracepção de barreira.
- D) Imunossupressão crônica.
- E) Idade > 55 anos
- 36. (CONCURSO CRATO/2021) O atendimento de pré-natal é definido como aquele prestado por profissionais de saúde com a finalidade de garantir as melhores condições possíveis para uma evolução fisiológica da gestação e um parto e nascimento saudáveis. Em relação à atenção de pré-natal baseada em evidências:**
- A) A bacteriúria assintomática é uma condição comumente observada na gestação, a qual não necessita de tratamento específico, mas sim, apenas de monitorização.
- B) A profilaxia com imunoglobulina anti-D em gestantes Rh-negativas não sensibilizadas com 28 a 34 semanas, deve ser realizada rotineiramente.
- C) O cronograma de consultas de atenção pré-natal é variável e não impacta diretamente, na morbidade materna. A maior parte da literatura considera aceitável um número mínimo de 5 consultas ao longo da gestação.
- D) Em relação à vacinação durante o período gestacional, ressalta-se que as vacinas produzidas com vírus vivo atenuado não apresentam restrição nesse período.
- E) A pesquisa para estreptococo do grupo B se faz necessária apenas para as gestantes acometidas previamente por essa infecção.
- 37. (CONCURSO CRATO/2021) O parto é caracterizado por contrações das fibras miométriais, cujas principais funções são a dilatação cervical e a expulsão do feto através do canal de parto. São características específicas e cada fase do parto:**
- A) Expulsão: também denominado terceiro período do parto, o canal de parto é completamente formado, ou seja, o segmento inferior do útero, o canal cervical totalmente dilatado e a vagina formam uma única cavidade.
- B) Dequitação: chamado de secundamento ou dequitação, o útero expelle a placenta e as membranas.
- C) A fase de dilatação, ou segundo período do parto, tem início com as primeiras modificações cervicais e termina com a dilatação completa do colo uterino (10 cm).
- D) A fase ativa do trabalho do parto geralmente tem início aos 2 cm de dilatação cervical e dura em média, 10 horas nas primíparas.
- E) Para o diagnóstico de trabalho de parto deve estar presente uma contração uterina a cada 10 minutos e uma dilatação de pelo menos, 2 cm.
- 38. (CONCURSO CRATO/2021) Atualmente, para a prática assistencial existe a necessidade de que o profissional de saúde apresente além da competência técnica, também, a dimensão política do trabalho, com vista ao atendimento às demandas, culturais, sociais econômicas, entre outras. Dessa forma, a implementação de protocolos para a gestão da atenção se faz necessária para a garantia da segurança do paciente. Os protocolos podem ser compreendidos como:**
- A) Diretrizes clínicas que possibilitam posicionamentos ou recomendações sistemáticas para orientar a equipe multidisciplinar e os próprios usuários para os cuidados de saúde apropriados.
- B) O fortalecimento na qualidade do atendimento não necessariamente perpassa pela implementação de protocolos de cuidado, ficando a critério de cada organização adotá-los ou não.



- C) A avaliação de indicadores de processos e resultados deve ser realizada por qualquer membro da equipe de saúde, não sendo necessário que cada protocolo defina previamente seu indicador de resultado esperado.
- D) Os estudos atuais não são claros quanto à efetividade da adoção de protocolos clínicos para fundamentar as intervenções em saúde.
- E) O desempenho da equipe multiprofissional frente às condições de saúde dos usuários pode ser avaliado muito satisfatoriamente sem a existência de protocolos de gestão do cuidado.
- 39. (CONCURSO CRATO/2021) O aumento da expectativa de vida tem contribuído para o crescimento da população idosa e com isso, o crescente número de pessoas que convivem com lesões cutâneas. Quanto à fisiopatologia das úlceras por pressão (UP), admite-se que:**
- A) A diminuição da vascularização pela oclusão dos vasos por longo período de pressão, ocasiona aumento do fluxo sanguíneo, responsável por nutrir e oxigenar os tecidos.
- B) O desenvolvimento de UP é ocasionado por diminuição na pressão de compressão exercida sobre os tecidos e aumento da capacidade de tolerância desses.
- C) Uma lesão isquêmica dificilmente pode ser ocasionada por uma pressão mantida por um período de uma a duas horas.
- D) Fatores intrínsecos como: fricção, cisalhamento e umidade podem ser responsáveis pelo surgimento de UP.
- E) Os capilares ocluídos desencadeiam vários eventos celulares e os tecidos subjacentes sofrem hipóxia, com surgimento de edema e prejuízos à perfusão local.
- 40. (CONCURSO CRATO/2021) Observa-se que a incidência de sepse (casos mais graves) vem aumentando ao longo dos anos, condição que mantém uma associação também, ao envelhecimento populacional, com elevada mortalidade. Em relação à abordagem a pacientes com sepse, tem que:**
- A) Recomenda-se iniciar a antibioticoterapia de amplo espectro logo após a definição do provável microrganismo e/ou sítio de infecção.
- B) A obtenção de culturas antes de iniciar a antibioticoterapia para os casos de sepse grave é mandatória.
- C) A hipotensão é uma condição que requer tratamento de ressuscitação inicial da sepse grave.
- D) Tem-se que a mortalidade por sepse é equivalente em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos, o que se leva a crer na homogeneidade de perfil e de tratamento para os casos em ambas realidades.
- E) Em quadros que evoluem com choque séptico, recomenda-se a infusão inicial e agressiva de soluções coloides.
- 41. (CONCURSO CRATO/2021) A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) equivale a um largo espectro de condições clínicas compatíveis com isquemia miocárdica e são responsáveis por grande parte dos óbitos na população mundial. Faz parte da abordagem inicial a pacientes com SCA, EXCETO:**
- A) Realização de eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações dentro de um tempo de 10 minutos da admissão.
- B) Administração de morfina, na persistência de dor torácica após as medidas anti-isquêmicas usuais.
- C) O uso de nitratos tem impacto indiscutível na mortalidade nos casos de SCA.
- D) O uso de ácido acetilsalicílico (AAS) dev ser realizado o mais brevemente possível em sacos suspeitos ou confirmados de SCA.
- E) O uso de estatinas para a prevenção secundária em pacientes com SCA deve ser iniciado antes da alta hospitalar.
- 42. (CONCURSO CRATO/2021) A queimadura é considerada um grave trauma, com elevada morbidade e mortalidade. Influenciam no prognóstico e determinam a sua gravidade, fatores como a profundidade da lesão e a extensão da superfície corporal queimada. Assim, pode afirmar que:**
- A) As queimaduras de segundo grau atingem estruturas profundas, como fáscia, músculo, tendões, vasos e nervos.
- B) Um grande queimado apresenta uma superfície corporal atingida > 25% ou com > 10% de área enxertada.
- C) Representa um critério de internação em unidade especializada para queimados a ocorrência de trauma térmico.



- D) A vacinação antitetânica para casos de queimaduras apenas será mandatória em grandes queimados.
- E) Nas queimaduras de espessura total os curativos não devem ser realizados, considerando que interferem negativamente na cicatrização.
- 43. (CONCURSO CRATO/2021) O processo de lactação é mecanismo fisiológico específico dos mamíferos, sendo constituído por uma série de eventos bioquímicos e teciduais de desenvolvimento e preparação das mamas. Assim, tem-se que:**
- A) A lactogênese não ocorre durante a gravidez em razão do efeito inibitório do estriol, da progesterona e do hormônio lactogênio placentário sobre os efeitos da prolactina nos alvéolos.
- B) A prolactina é grande responsável pela ejeção do leite nas células mioepiteliais que circundam os alvéolos mamários.
- C) O reflexo de ejeção do leite é menos complexo que o reflexo liberador de prolactina, sendo menos suscetível a fatores emocionais e ambientais.
- D) A lactopoesse diz respeito ao conjunto de eventos relacionados a secreção de colostro, a partir do segundo trimestre de gestação.
- E) O colostro é um fluido rico em carboidratos e gorduras, com redução relativa de proteínas.
- 44. (CONCURSO CRATO/2021) O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil é uma estratégia necessária para a garantia de uma criança competente para responder às suas necessidades em seu contexto de vida. Pode inferir que:**
- A) O índice de crescimento é apontado como um indicador que reflete exclusivamente, a condição de saúde pregressa de crianças e adolescentes.
- B) O índice de crescimento da criança permite avaliar o desenvolvimento social e econômico de uma nação.
- C) Até os dois anos de idade, os fatores exógenos não afetam o crescimento de forma determinante.
- D) O crescimento infantil pode ser avaliado através da identificação da capacidade da criança para realizar atividades das mais simples, para as mais complexas.
- E) O controle esfinteriano é manifestado na criança logo após seu primeiro ano de vida, na maioria das crianças.
- 45. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional de Humanização (PNH) preconiza a necessidade de adotar a humanização como uma política transversal que atualiza um conjunto de princípios e diretrizes por meio de ações e modos de agir nos diversos serviços, práticas de saúde e instâncias do sistema, caracterizando uma construção coletiva. Constitui-se em um objetivo da PNH:**
- A) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- B) Valorização do trabalho e do trabalhador
- C) Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a família e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da família e da comunidade.
- D) Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.
- E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- 46. (CONCURSO CRATO/2021) A bioética é o conjunto de valores humanos nas ciências que estudam a vida, sendo baseada em quatro princípios fundamentais, que representa:**
- A) A justiça, a qual versa sobre o direito do indivíduo de fazer suas escolhas sobre a própria vida, de modo a agir conforme julgar ser melhor para si.
- B) A não maleficência, que consiste em intencionalmente não causar problemas a outrem.
- C) A beneficência, a qual trata sobre o dever moral de agir em benefício do outro, de potencializar os benefícios e de minimizar os possíveis prejuízos.
- D) A autonomia, fundamentada no dever de distribuir de forma justa os recursos e os bens, preocupando-se com a equidade, ou seja, com tratar de forma diferente os desiguais.
- E) A autonomia, que norteia o comportamento do sujeito em uma comunidade, é normativa e consiste em um conjunto de práticas baseadas em costumes e convenções.





**47. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, tem por finalidade disciplinar a descentralização político-administrativa. A referida Lei, em seu capítulo II, assegura e explica os princípios doutrinários e as Diretrizes Organizativas para o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Compreende-se como uma Diretriz Organizativa da LOS 8.080, bem como, sua finalidade correspondente:**

- A) Integralidade: dispor recursos para o restabelecimento do equilíbrio saúde-doença na proporção da necessidade, e para aqueles em situação de maior vulnerabilidade e risco de agravos à saúde.
- B) Regionalização: acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sem discriminação.
- C) Hierarquização: garantia da assistência em todos os níveis de atenção do sistema de saúde em nível nacional e consideração da saúde como processo dinâmico que exige atenção sobre as diferentes dimensões de necessidades.
- D) Universalidade: objetiva estabelecer um fluxo ordenado dos usuários no sistema de saúde e a organização da rede, com base na alocação de arsenal tecnológico diferenciado, de acordo com o nível de atenção no qual o equipamento de saúde está inserido
- E) Descentralização: com ênfase na municipalização da gestão, de modo que os municípios se constituam responsáveis diretos pela organização de seu sistema local de saúde, sendo a base desse processo o perfil social, epidemiológico, sanitário, político e cultural da região e da população.

**48. (CONCURSO CRATO/2021) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma das principais iniciativas para a superação do modelo biomédico, para subsidiar a implementação dos princípios e diretrizes do SUS, e conseqüentemente, para o processo de reorganização do sistema de saúde, tendo como base a Atenção Primária à Saúde (APS). No Brasil, a construção de um modelo assistencial para a atenção básica ainda representa um desafio. Nesse contexto, no que se refere aos modelos assistenciais em saúde, pode-se afirmar que:**

- A) O modelo sanitário camponês, do início do século XX, previa a reorganização e racionalização dos servi-

ços sem mudança de concepção de saúde e de modo de intervenção no processo saúde-doença.

- B) O modelo clínico liberal ou médico assistencial privatista era baseado na concepção do trabalho fragmentado, com predomínio de práticas hierarquizadas e de desigualdade entre as diferentes categorias profissionais.
- C) O modelo biomédico reconhece a importância de formar recursos humanos para o SUS.
- D) O modelo saúde da família apresenta dificuldade na implantação da integralidade, tanto no entendimento da multidimensionalidade do ser humano, quanto na integração entre níveis de atenção.
- E) No modelo biomédico o planejamento em saúde é pouco utilizado como ferramenta de gestão e temas como vínculo e acolhimento não são priorizados.

**49. (CONCURSO CRATO/2021) As famílias, entendidas como sistemas sociais, possuem uma grande variação de características estruturais. No contexto da organização familiar:**

- A) A família nuclear, conjugal ou elementar seria aquela organizada como: pai, mãe e filhos nascidos dessa união; os irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, habitando o mesmo espaço e tendo sua união reconhecida pelos demais membros da comunidade.
- B) A família extensa compreende o conjunto de cônjuges e de seus filhos na sociedade poligâmica, sob duas modalidades: a poliginia (um homem com mais de uma esposa) ou a poliandria (uma mulher com vários maridos).
- C) A família composta se constitui por uma rede familiar ligando consanguíneos, aliados e descendentes, ao longo de pelo menos três gerações, correspondendo, em geral, a uma unidade doméstica (propriedade da terra e das habitações).
- D) A família nuclear deve ser reconhecida como a forma de organização familiar mais favorável para a assistência em saúde.
- E) O modelo de família extensa pode ser verificado em quase todas as formas de organização social, como forma dominante ou como unidade complementar às outras formas de organização familiar.



**50. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Dessa forma:**

- A) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora deverá contemplar apenas as pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou em relações informais e precárias de trabalho, em atividades de maior risco para a saúde, submetidos a formas nocivas de discriminação, ou ao trabalho infantil, na perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde e de buscar a equidade na atenção.
- B) A identificação das necessidades, demandas e problemas de saúde dos trabalhadores no território é um dos objetivos dessa Política.
- C) A proposição e produção de indicadores conjuntos para monitoramento e avaliação da situação de saúde também se constitui em um objetivo fundamental da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
- D) A orientação e ordenação dos fluxos das ações e dos serviços de saúde do trabalhador são responsabilidades exclusivas dos municípios na implementação dessa Política.
- E) O estabelecimento e a adoção de parâmetros protetores da saúde dos trabalhadores nos ambientes e processos de trabalho é uma diretriz norteadora da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

**51. (CONCURSO CRATO/2021) Os transtornos de humor englobam um grande grupo de manifestações em que alterações de humor e sintomas associados predominam no quadro clínico. Dentre os transtornos de humor, o mais prevalente é o transtorno depressivo maior, com prevalência de 8% da população geral. São afirmações verdadeiras sobre o transtorno depressivo maior, EXCETO:**

- A) Estado civil: casado ou em união estável é um fator de risco.

- B) Mulheres apresentam até duas vezes mais prevalência do que homens.
- C) 50% dos casos têm início entre 20 e 50 anos de idade.
- D) A idade média de início é de 40 anos.
- E) Homens, idosos e adolescentes apresentam maior risco de cometer suicídio.

**52. (CONCURSO CRATO/2021) O atendimento especializado a vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) requer a adoção de protocolo organizado, a fim de agilizar as etapas e diminuir o tempo para a terapêutica. Recomenda-se a implementação de metas de tempo, de acordo com o *National Institute of Neurological Disorders (NINDS)*. Qual a correlação adequada em se tratando dessa recomendação?**

- A) Tempo porta-médico:  $\leq 5$  minutos.
- B) Tempo porta-fibrinolítico:  $\leq 60$  minutos.
- C) Tempo porta-realizar tomografia de crânio:  $\leq 20$  minutos.
- D) Tempo porta-time de AVC:  $\leq 10$  minutos.
- E) Tempo porta-interpretação da tomografia de crânio:  $\leq 30$  minutos.

**53. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida... Representa uma situação elegível de uma abordagem em cuidados paliativos de acordo com a OMS:**

- A) Doença sem tratamento específico.
- B) Presença de enfermidade com idade avançada do indivíduo.
- C) Enfermidade avançada, progressiva e incurável.
- D) Doença neoplásica no idoso.
- E) Resposta insatisfatória ao tratamento empírico.



**54. (CONCURSO CRATO/2021) Wanda Horta desenvolveu sua metodologia assistencial considerando o processo de enfermagem (PE) como ferramenta para o alcance da adequação da assistência de enfermagem ao paciente. De acordo com Horta, o processo de enfermagem possui seis fases. Qual descrição de fase do PE s adequa à sua definição?**

- A) Evolução de enfermagem: determina-se uma assistência envolvendo todos os problemas identificados pelo enfermeiro.
- B) Prescrição de enfermagem: realizam-se relatos diários, identificando mudanças ocorridas e avaliando a reposta do indivíduo à assistência implementada.
- C) Histórico de enfermagem: após os problemas de enfermagem identificados, determina-se as necessidades do indivíduo de acordo com o grau de dependência do atendimento em sua complexidade.
- D) Prognóstico de enfermagem: análise da evolução do quadro clínico do indivíduo, com uma previsão acerca da capacidade do ser humano em atender suas necessidades básicas momentaneamente alteradas ou afetadas.
- E) Diagnóstico de enfermagem: levantamento de dados considerados pelo enfermeiro como significativos.

**55. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com as recomendações atuais da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o rastreamento consiste em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é diagnosticar o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ou a condição de pré-diabetes em indivíduos assintomáticos. Essa atividade tem grande importância para a saúde pública, pois está diretamente ligada à possibilidade de diagnóstico e tratamento precoces, minimizando os riscos de desenvolvimento de complicações, principalmente microvasculares. Em relação a essas recomendações, tem que:**

- A) As atividades de rastreamento do DM2 devem ser realizadas, de preferência, em ambiente distinto do qual a população é habitualmente tratada.
- B) A glicemia de 2 horas pós-sobrecarga diagnóstica menos casos que o restante, sendo o teste mais utilizado.
- C) A recomendação de atividade física aeróbica moderada (tipicamente, caminhar rápido) por 150 minutos/semana, distribuída em pelo menos três sessões.

Cada sessão de exercício deve durar mais que 10 minutos e não passar de 75 minutos.

- D) Embora muito recomendada, a mudança do estilo de vida não demonstrou redução na incidência de DM2 nos estudos utilizados para a recomendação da SBD.
- E) Em mulheres com história de diabetes gestacional, a metformina está proscrita.

**56. (CONCURSO CRATO/2021) As Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020), conceituam a hipertensão arterial (HA) como uma doença crônica não transmissível (DCNT) definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam os riscos. Trata-se de uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais, caracterizada por elevação persistente da pressão arterial (PA), ou seja, PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, medida com a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação anti-hipertensiva. São considerados fatores de risco para a HÁ:**

- A) Em torno de 65% dos indivíduos acima dos 60 anos apresentam HÁ.
- B) A etnia é um fator de risco importante para a HA, e condições socioeconômicas e de hábitos de vida são fatores menos relevantes.
- C) A relação entre o excesso de peso (sobrepeso/obesidade) e os níveis de PA ainda não estão bem estabelecidos nos estudos.
- D) Há uma associação indireta entre sedentarismo, elevação da PA e da HÁ.
- E) Entre os fatores socioeconômicos, podemos destacar maior escolaridade, além de maior renda familiar, como fatores de risco significativo para HA.

**57. (CONCURSO CRATO/2021) O acolhimento como dispositivo tecno-assistencial permite refletir e mudar os modos de operar a assistência, pois O Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) e as mudanças possíveis no trabalho nos serviços de urgência Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de Urgência questiona a clínica no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e o acesso**



**aos serviços. A avaliação de risco e vulnerabilidade não pode ser considerada prerrogativa exclusiva dos profissionais de saúde: o usuário e sua rede social devem também ser considerados neste processo. Em relação aos eixos e áreas para o ACCR, pode afirmar que:**

- A) EIXO AMARELO: Este eixo está relacionado à clínica do paciente grave, com risco de morte.
- B) EIXO AZUL: é o eixo dos pacientes aparentemente mais graves. O arranjo do espaço deve favorecer o acolhimento do cidadão e a classificação do grau de risco.
- C) Área Amarela: composta por uma sala de retaguarda para pacientes ainda não estabilizados, porém que ainda requerem cuidados especiais (pacientes críticos ou semicríticos).
- D) Área vermelha: composta pelas salas de observação, que devem ser divididas por sexo (feminino e masculino) e idade (crianças e adultos), a depender da demanda.
- E) Área Vermelha: é nesta área que está a sala de emergência, para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte, e a sala de procedimentos especiais invasivos.

**58. (CONCURSO CRATO/2021) Nos últimos anos há uma incidência crescente de infecções sexualmente transmissíveis (IST), mais de um milhão de IST são adquiridas todos os dias em todo o mundo. Assim: corrimento vaginal intenso, amarelo-esverdeado, bolhoso, com odor fétido (na maioria dos casos, lembrando a peixe), está associado a:**

- A) Infecção por Micoplasma.
- B) Tricomoníase.
- C) Infecção por *Chlamydia trachomatis*.
- D) Donovanose.
- E) Vaginose bacteriana.

**59. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o estabelecido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), através do Calendário Nacional de Vacinação, uma criança com 04 meses de idade deve receber quais vacinas e doses?**

- A) A 1ª dose da vacina contra Rotavírus; a 2ª dose da vacina contra a Poliomielite; e a 3ª dose da vacina Pentavalente.

- B) A 2ª dose da vacina contra Rotavírus; a 1ª dose da vacina contra a Poliomielite; e a 1ª dose da vacina Pneumocócica 10.
- C) A 1ª dose da vacina contra Rotavírus; a 1ª dose da vacina contra a Poliomielite; e a 2ª dose da vacina Pneumocócica 10.
- D) A 2ª dose da vacina contra Rotavírus; a 2ª dose da vacina contra a Poliomielite; a 2ª dose da vacina Pneumocócica 10; e a 2ª dose da vacina Pentavalente.
- E) Apenas a 2ª dose da vacina contra Rotavírus.

**60. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) reconhece a necessidade de identificar os elementos psicossociais que acarretam a vulnerabilidade da população masculina, além de evidenciar os principais fatores de morbimortalidade como uma estratégia de atenção integral à saúde, haja vista que muitos agravos poderiam ser evitados, caso os homens realizassem, com regularidade, as medidas de prevenção primária. O principal objetivo da PNAISH constitui:**

- A) Promover a humanização, qualidade de vida e promoção da integralidade do cuidado na população masculina, promovendo o reconhecimento e respeito à ética e aos direitos obedecendo às suas peculiaridades socioculturais.
- B) Articular-se com as diversas áreas do governo com o setor privado e a sociedade, compondo redes de compromisso e corresponsabilidade quanto à saúde e a qualidade de vida da população masculina.
- C) Disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos.
- D) Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e avaliação continuada dos serviços e do desempenho dos profissionais de saúde, com participação dos usuários.
- E) Facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade e a melhoria das condições de saúde.