



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

31. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986, Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. O profissional técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe especialmente:

- A) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- B) Consulta de enfermagem.
- C) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.
- D) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- E) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.

32. (CONCURSO CRATO/2021) A Resolução COFEN Nº 564/2017 aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e considera que: "A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade." Analise as afirmações que se seguem e opte pela assertiva CORRETA:

- A) Considera-se infração ética e disciplinar, a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- B) Ser reincidente em relação à ocorrência de infrações éticas, é considerada uma circunstância atenuante, pelo novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- C) A advertência verbal consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- D) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 10 anos.

E) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período máximo de 30 dias.

33. (CONCURSO CRATO/2021) As vacinas permitem a prevenção, controle, eliminação e a erradicação das doenças imunopreveníveis. As atividades de imunização devem cuidadosamente observadas, adotando-se protocolos de segurança antes, durante e após a administração dos imunobiológicos. Sobre os cuidados de armazenamento e administração de vacinas, é INCORRETA a afirmação:

- A) A vacina BCG é preparada com bacilos vivos a partir das cepas do Mycobacterium bovis, atenuada com o glutamato de sódio, sendo administrada por via intradérmica, feita na inserção inferior do deitóiode direito.
- B) Em relação à via de administração, recomenda-se para vacinação com via intramuscular, o vasto lateral em crianças < 2 anos de idade e, o deltóiode a partir de 2 anos de idade.
- C) A vacina dT é indicada para a proteção da gestante contra o tétano acidental e a prevenção do tétano neonatal.
- D) A vacina contra a influenza não está recomendada na gestação pelo risco de causar danos ao feto.
- E) As vacinas podem ser mantidas em temperatura entre +2°C a +8°C em geladeiras com capacidade a partir de 280 litros em nível local. Na primeira prateleira, devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa (por exemplo: contra poliomielite, sarampo, febre amarela, rubéola, tríplice viral).

34. (CONCURSO CRATO/2021) O acompanhamento de pré-natal de risco habitual/baixo risco, deve garantir o atendimento integral, com vistas à promoção da saúde, prevenção de agravos e escuta qualificada das necessidades da gestante. De acordo com o Ministério da Saúde, são atribuições do profissional técnico de enfermagem, EXCETO:

- A) Conferir as informações preenchidas no cartão/caderneta da gestante.
- B) Aplicar vacinas (exemplo: antitetânica e contra hepatite B).



- C) Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no cartão/caderneta da gestante.
- D) Orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas e realizar a busca ativa das gestantes faltosas.
- E) Realizar os testes rápidos.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Para o Ministério da Saúde, O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da mortalidade infantil. Define-se aleitamento materno exclusivo:

- A) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
- B) Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
- C) Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
- D) Quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.
- E) Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

36. (CONCURSO CRATO/2021) O profissional técnico de enfermagem deve conhecer as competências éticas e legais para a administração segura de medicamentos. Quanto aos métodos de administração de medicamentos, tem-se que:

- A) A administração via enteral compreende a administração dos medicamentos via por oral, via sonda nasogástrica, com exceção, da administração via sonda nasoenteral.
- B) Na administração tópica, a ação da droga, em geral localizada no local de aplicação, o que reduz a incidência de efeitos colaterais sistêmicos.

- C) A introdução de medicamentos diretamente na corrente sanguínea é definida como a via endovenosa, sendo uma via menos rápida, que dificilmente acarreta efeitos colaterais sistêmicos.
- D) Na administração de medicamentos pela via intramuscular, ocorre a deposição da droga no tecido muscular, sendo que o medicamento dificilmente, alcança a via sistêmica.
- E) A via retal é considerada a via mais rápida para a administração de medicamentos, sendo reservada para drogas irritantes ao trato gastrointestinal.

37. (CONCURSO CRATO/2021) O manejo apropriado de pacientes com úlcera por pressão em cuidados domiciliares é um desafio para os profissionais de enfermagem, os quais devem fornecer orientações adequadas aos cuidadores. Para isso, o profissional técnico de enfermagem precisa conhecer os princípios básicos para o tratamento adequado dessas lesões por pressão, que implica reconhecer que;

- A) Curativos que retêm a umidade das feridas não são apropriados para tratamento de úlceras por pressão.
- B) As feridas devem ser limpas a cada troca de curativo, com força necessária o suficiente para garantir toda a limpeza do leito da lesão, especialmente, quando essa limpeza for auxiliada pelo uso de gazes cirúrgicas.
- C) Solução salina é preferida para a limpeza das úlceras por pressão, por ser fisiológica e não danificar os tecidos em cicatrização.
- D) Mesmo pacientes em cuidados domiciliares, não devem se utilizar de água potável (chuveiro) para a limpeza das feridas ocasionadas por pressão.
- E) O uso de agentes antissépticos é o mais indicado para a limpeza de úlceras por pressão em ambiente domiciliar.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Os estudos consideram a necessidade de que as equipes de Atenção Básica estejam atentas, não apenas para os sintomas de diabetes mellitus (DM), mas também, para seus fatores de risco (hábitos alimentares não saudáveis, sedentarismo e obesidade), como estratégia importante para a identificação precoce de casos de DM. Nesse sentido:



- A) Sinais e sintomas como: fadiga, fraqueza, letargia, visão turva, prurido vulvar ou cutâneo, balanopostite; são considerados, específicos para diabetes.
- B) O DM tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos.
- C) O termo "DM tipo 1" é usado para designar uma deficiência relativa de insulina, isto é, há um estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua secreção.
- D) Geralmente, a suspeita do DM tipo 1 é feita pela presença de uma complicação tardia, como proteinúria, retinopatia, neuropatia periférica, doença arteriosclerótica ou então por infecções de repetição.
- E) O técnico de enfermagem deve realizar consulta de enfermagem para pessoas com maior risco para desenvolver DM tipo 2, abordando fatores de risco, estratificação do risco cardiovascular.
- 39. (CONCURSO CRATO/2021) Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. O Acolhimento é considerado uma diretriz da PNH e pode ser definido como:**
- A) A inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão - que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.
- B) Um espaço saudável, acolhedor e confortável, que respeite a privacidade, propicie mudanças no processo de trabalho e seja lugar de encontro entre as pessoas.
- C) Uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- D) A inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho.
- E) O reconhecimento de que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações, sendo construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva.
- 40. (CONCURSO CRATO/2021) No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, tendo em vista que a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Pode-se considerar como um fator de risco para câncer de mama:**
- A) Idade da mulher.
- B) Gravidez a termo.
- C) Multiparidade.
- D) Gravidez precoce.
- E) Menopausa precoce.
- 41. (CONCURSO CRATO/2021) O câncer do colo do útero (CCU) geralmente se desenvolve de forma lenta, sendo assintomático por vários anos. Esse câncer tem agente causal conhecido e prevenção eficaz, porém ainda é um desafio para o sistema de saúde brasileiro. Sobre esse tipo de câncer, é INCORRETO afirmar:**
- A) Baixo nível socioeconômico é considerado um fator de risco.
- B) Geralmente, a mulher com sintomas de câncer do colo do útero tem idade entre 45 e 55 anos.
- C) Todas as mulheres com infecção pelo papilomavírus humano (HPV) irão desenvolver essas neoplasia.
- D) O uso de contraceptivo hormonal oral durante cinco anos ou mais aumenta o risco para CCU.
- E) O CCU é a terceira causa de morte por câncer, na população feminina brasileira.
- 42. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8.080/1990, é princípio ético doutrinário do Sistema Único de Saúde (SUS):**
- A) A descentralização.
- B) A Regionalização.



- C) O acolhimento.
- D) A humanização.
- E) A equidade.

43. (CONCURSO CRATO/2021) O acesso venoso periférico é a inserção de um cateter ou agulha em uma veia periférica, com a finalidade de coletar sangue para amostras laboratoriais ou infundir drogas ou soluções. Em relação aos locais de aplicação endovenosa, é possível inferir que:

- A) As veias basilicas, localizadas ao longo do osso radial, devem ser utilizadas para a maioria das terapias endovenosas.
- B) As veias metacárpicas, localizadas no dorso da mão, são veias pouco calibrosas, cuja punção é dolorosa e dificultada,
- C) As veias anticubitais, localizadas na fossa anticubital, devem ser evitadas por terem a punção muito dolorosa e implicarem na perda de mobilidade.
- D) As veias cefálicas acessórias, localizadas ao longo do osso radial, possuem a vantagem de serem calibrosas e podem ser utilizadas na maioria das terapias endovenosas.
- E) As veias digitais devem ser utilizadas, preferencialmente, para infusões de grandes volumes e terapias prolongadas.

44. (CONCURSO CRATO/2021) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências são componentes dessa Rede, cujo objetivo consiste em:

- A) Ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades.

B) Chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/ou transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.

C) Aglutinar esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas e/ou em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, considerando-se seus riscos.

D) Funcionar como ambiente para estabilização de pacientes críticos e/ou graves, com condições de garantir a assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de saúde, articulado e conectado aos outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à rede de atenção à saúde pela central de regulação das urgências.

E) Desenvolver ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, constituindo-se nova modalidade de atenção à saúde que acontece no território e reorganiza o processo de trabalho das equipes, que realizam o cuidado domiciliar na atenção primária, ambulatorial e hospitalar.

45. (CONCURSO CRATO/2021) A caracterização do tipo sanguíneo e do fator RhD faz parte do rastreamento da doença hemolítica perinatal (DHPN), durante a assistência de pré-natal. A DHPN decorrente da incompatibilidade RhD pode ocorrer quando:

- A) A gestante é RhD positivo, o parceiro é RhD negativo e, o feto, RhD positivo.
- B) Quando gestante e parceiro são RhD negativos e o feto também RhD negativo.
- C) Quando a gestante é RhD negativo, o parceiro é RhD positivo e, o feto, RhD positivo.
- D) Necessariamente, a gestante e o feto precisam ser RhD negativos.
- E) Quando o parceiro é RhD positivo, gestante RhD negativo e feto, RhD positivo.