



ENFERMEIRO PSF

31. (CONCURSO JARDIM/2022) A Estratégia Saúde da Família (ESF) representa uma das mais importantes tentativas para a superação da atenção pautada no modelo biomédico, bem como, para a consolidação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Um desafio a ser superado para a implementação do modelo assistencial preconizado pelo Saúde da Família é a integralidade. Esse desafio pode ser exemplificado através:

- A) Da compreensão da multidimensionalidade do ser humano.
- B) Da sobrecarga de trabalho.
- C) Das condições precárias de infraestrutura das unidades de saúde da família.
- D) De falhas no processo de educação permanente.
- E) Problemas do quantitativo da equipe em relação à população adscrita.

32. (CONCURSO JARDIM/2022) Para Merhy, o "modelo technoassistencial" é utilizado para designar um processo composto por "tecnologias do trabalho em saúde" e a assistência, como uma "tecnologia do cuidado" operada por três tipos de arranjos tecnológicos: tecnologias leves, leve-duras e duras. Esse autor propõe a concepção de "trabalho vivo", com emprego das tecnologias do cuidado focadas nas necessidades dos usuários. Assinale a alternativa que melhor representa o chamado "trabalho vivo":

- A) Equipamentos e o saber tecnológico.
- B) Efetivação das tecnologias duras.
- C) Uso de tecnologias relacionais.
- D) Organização do trabalho a partir da demanda espontânea.
- E) Organização das práticas de saúde com foco nas queixas dos usuários.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) A Organização Mundial da Saúde (OMS), propõe o modelo dos cuidados inovadores para condições crônicas (CICC),

em três âmbitos de aplicação: o âmbito macro, o âmbito meso e o âmbito micro. O Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) traz em seu escopo, esses três âmbitos, sendo um componente gerenciado no âmbito meso:

- A) As relações profissionais de saúde/usuários/famílias.
- B) A falta de competência profissional associada a déficits de formação.
- C) O enfrentamento da falta de autonomia dos usuários.
- D) A elaboração de políticas que considerem as especificidades associadas às condições crônicas.
- E) A utilização de tecnologias de gerenciamento das condições crônicas.

34. (CONCURSO JARDIM/2022) O Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) na Estratégia saúde da Família (ESF), incorpora a mudança de atenção centrada no indivíduo para a atenção centrada na família. "O componente da atenção centrada na família deriva do atributo da APS que é a orientação familiar" (OPAS/OMS). A atenção centrada na família pressupõe:

- A) Abordagens profissionais diferentes para distintas subpopulações (crianças, adultos e mulheres).
- B) Reconhece em seu conceito de família, a família nuclear ou simples, apenas.
- C) O processo de territorialização não é fundamental para a abordagem familiar.
- D) A ausência de planejamento familiar representa um fator de risco pessoal para a abordagem em família.
- E) As ferramentas de abordagem familiar são tecnologias que objetivam estreitar as relações entre os profissionais e as famílias.

35. (CONCURSO JARDIM/2022) A Atenção Primária à Saúde (APS), organizada, especialmente, através da ESF, possui diretrizes que possibilitam o alcance dos objetivos desse modelo de atenção. Uma importante diretriz da APS, consiste:

- A) Ser resolutiva; a partir da identificação dos riscos, demandas e necessidades de saúde.
- B) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde resolutivos e de qualidade.



- C) Ordenar a rede de atenção à saúde, organizando-as conforme as necessidades de saúde da população.
- D) Coordenar o cuidado, acompanhar e gerenciar projetos terapêuticos singulares.
- E) Ser base; possuir o mais elevado grau de descentralização e capilaridade.
- 36. (CONCURSO JARDIM/2022) Uma teoria de enfermagem é uma conceitualização de algum aspecto de enfermagem comunicado com a finalidade de descrever, explicar, prever e/ou prescrever o cuidado de enfermagem (BARNUM, 1994; MELEIS, 1997). Reconhecidamente, a enfermagem se identifica por um paradigma, o qual consiste na inter-relação de quais elementos, EXCETO:**
- A) Saúde.
- B) Enfermagem.
- C) Pessoa.
- D) Autocuidado.
- E) Ambiente.
- 37. (CONCURSO JARDIM/2022) A Lei 7.498/1986, Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. De acordo com essa legislação, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente:**
- A) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
- B) A consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem;
- C) A assistência à parturiente e ao parto normal.
- D) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- E) A prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de Enfermagem.
- 38. (CONCURSO JARDIM/2022) Considerando a situação apresentada: "Um enfermeiro falha em administrar medicamento com precisão em relação ao horário". Em qual elemento de responsabilização deve incidir essa prática:**
- A) Dano comprovado.
- B) Incompetência para atender ao padrão de cuidado (quebra do dever).
- C) Incompetência para atender ao padrão de cuidado (quebra do dever) e dano comprovado.
- D) Previsibilidade do prejuízo.
- E) Imprudência.
- 39. (CONCURSO JARDIM/2022) No que se refere à patogênese das úlceras por pressão (UP), é INCONSISTENTE afirmar que:**
- A) Os indivíduos mais suscetíveis são aqueles com imobilidade, não sendo fator importante, o comprometimento da percepção sensorial.
- B) As UP não costumam ocorrer em indivíduos saudáveis.
- C) O desenvolvimento de uma UP, geralmente, é multifatorial.
- D) É essencial eliminar a presença de fricção ou cisalhamento.
- E) Uma pressão capilar entre 12 a 322 mmHg usualmente, é responsável por seu colapso.
- 40. (CONCURSO JARDIM/2022) A dengue é uma doença causada por um arbovírus do gênero *Flavivirus*, que possui quatro sorotipos. Para essa condição, os casos graves devem a:**
- A) Febre alta de início súbito, com duração de 5 a 7 dias.
- B) Dejeções diárias líquidas.
- C) Disfunção endotelial.
- D) Sintomas respiratórios.
- E) Disgeusia.
- 41. (CONCURSO JARDIM/2022) A tuberculose, doença infecciosa e transmissível, tem como agente etiológico o *Mycobacterium tuberculosis* (MTB), sendo um sério problema de saúde pública no território brasileiro. Quando aos seus sinais e sintomas, necessários ao diagnóstico, está correta a informação:**



- A) Febre vespertina e sudorese noturna são comuns em estágios avançados da doença.
- B) Tosse seca com laivos de sangue, no período noturno, é muito comum em fases iniciais.
- C) História de anorexia e perda de peso praticamente, fecham o diagnóstico.
- D) A hemoptise é uma condição comumente associada (acima de 80
- E) Dor pleurítica pode estar associada.

42. (CONCURSO JARDIM/2022) A infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) representa uma pandemia de importância mundial. Em relação aos testes diagnósticos, é procedente afirmar que:

- A) A detecção de anticorpos para proteínas específicas do HIV é teste confirmatório.
- B) A detecção viral direta (PCR/RT-PCR) é padrão ouro para os casos de infecção crônica.
- C) A detecção de anticorpos anti-HIV (IgM e IgG) é um teste recomendado para a infecção aguda.
- D) A positividade em teste rápido é confirmatório para diagnóstico.
- E) A detecção de antígeno p24 e anticorpos, simultaneamente, deve ser aplicada a casos de exposição com período superior a 5 dias.

43. (CONCURSO JARDIM/2022) O envelhecimento populacional no mundo e no Brasil alerta para a crescente necessidade de uma atenção qualificada para esse público. Os estudos apontam que a ocorrência de queda na pessoa idosa representa um evento sentinela para o declínio das funções orgânicas. São reconhecidos dois elementos principais na avaliação de quedas. São eles, sequencialmente:

- A) Avaliação do ambiente e dos fatores de comorbidades.
- B) Uso de medicações diuréticas e sedativas.
- C) Anamnese/exame e avaliação do ambiente.
- D) Uso de anti-hipertensivos e quedas prévias.
- E) Sedentarismo e uso de bebida alcoólica.

44. (CONCURSO JARDIM/2022) A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que "glicemia elevada é o terceiro fator, em importância, da causa de mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial aumentada e uso de tabaco". Em relação às atuais recomendações/orientações contidas nas Diretrizes brasileiras, é INCORRETO:

- A) As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as principais causas de óbito em indivíduos com diabetes.
- B) Indivíduos com hanseníase devem ser monitorados quanto à existência de diabetes.
- C) Controle de obesidade e intervenções em hipertensão arterial, dislipidemia e sedentarismo previnem o surgimento de diabetes tipo 2 e evitam doenças cardiovasculares.
- D) Na maior parte dos países em desenvolvimento, a incidência de diabetes melito é maior na população idosa.
- E) Na atualidade, a prevenção primária do diabetes tipo 1 não tem base racional que se possa aplicar à população geral.

45. (CONCURSO JARDIM/2022) Dados da literatura estimam em torno de 300 mil a 400 mil casos anuais de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), com elevada letalidade. Opte pela alternativa que apresenta um preditor de risco INDEPENDENTE para esta condição:

- A) Gênero feminino.
- B) Idade avançada.
- C) Glicose elevada.
- D) Níveis pressóricos elevados.
- E) Dislipidemia.

46. (CONCURSO JARDIM/2022) Desde 1970, A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o Acidente Vascular Cerebral (AVC) como "o rápido desenvolvimento de sinais clínicos de alteração focal (ou global) da função cerebral, com duração superior a 24 horas ou levando à morte, sem causa aparente, que não a de origem vascular". Independentemente da etiologia do AVC, o único exame laboratorial indispensável antes do início do tratamento, trata-se:

- A) Dosagem de troponinas.



B) Contagem de plaquetas.

C) Glicemia.

D) Creatinina sérica.

E) Tempo de tromboplastina parcial ativada.

47. (CONCURSO JARDIM/2022) O *Trichomonas vaginalis* é um protozoário flagelado causador de tricomoníase, doença de transmissão sexual não viral, mais frequente no mundo. Analise as afirmações abaixo, optando pela mais assertiva para o diagnóstico desta condição patológica.

A) Deve-se suspeitar da infecção em mulheres sexualmente ativas, com um corrimento vaginal excessivo e irritante, e percepção de odor no trato genital.

B) As máculas avermelhadas na cérvix são muito frequentes em mulheres infectadas.

C) A presença de um corrimento vaginal com aspecto bolhoso já é suficiente ao diagnóstico.

D) Descarga vaginal abundante é sempre sinal de tricomoníase.

E) Odor desagradável ao teste das aminas é patognômico de tricomoníase.

48. (CONCURSO JARDIM/2022) A identificação do tipo sanguíneo e do fator RhD da gestante faz parte do rastreamento pré-natal para a Doença Hemolítica Perinatal (DHPN). Caso a gestante seja RhD-negativo, é INCORRETO:

A) É imprescindível identificar o tipo sanguíneo do parceiro.

B) Caso o parceiro seja RhD-negativo, a pesquisa é encerrada.

C) Quando o tipo sanguíneo do parceiro é desconhecido, segue-se com a mesma propedêutica realizada em caso de parceiro RhD-positivo.

D) Os únicos antígenos eritrocitários capazes de provocar sensibilidade materna são os pertencentes ao sistema RhD, por isso, não se deve realizar pesquisa de anticorpos irregulares em mulheres RhD-positivo.

E) A pesquisa de sensibilização materna ao antígeno RhD em mulheres RhD-negativo deve ser realizada mensalmente na atenção de pré-natal, sendo que, uma vez positivada, segue-se com o protocolo de aloimunização RhD.

49. (CONCURSO JARDIM/2022) Durante a avaliação de pré-natal, deve-se proceder ao rastreamento de diabetes prévio à gestação ou diabetes gestacional, importante estratégia para diminuir complicações maternas e perinatais. Quanto ao rastreamento, pode-se inferir que:

A) Valores de glicemia em jejum abaixo de 92 mg/dL são considerados normais.

B) Quando a glicemia de jejum for considerada normal não há necessidade de se prosseguir com o rastreamento, logo, o teste de tolerância à glicose oral com 75 g entre 24 e 28 semanas, está dispensado.

C) *Diabetes mellitus* gestacional é definido na presença de valores de glicemia de jejum de 126 mg/dL ou superiores.

D) Na presença de diabetes prévio à gravidez (*overt* diabetes), caso a hemoglobina glicada (HbA1C) superior a 4,5%, confirma o diagnóstico.

E) Na interpretação do teste de tolerância oral à glicose, valores de glicemia 1 hora após a sobrecarga, são normais quando inferiores a 153 mg/dL.

50. (CONCURSO JARDIM/2022) O aleitamento materno exclusivo é uma estratégia que isoladamente, evita mortes infantis, em especial, nos primeiros meses de vida. O profissional enfermeiro deve estar apto a avaliar sinais diretos e/ou indiretos indicativos de uma efetiva amamentação. É indicativo de boa mamada?

A) Dor mamilar e alterações no formato mamilar imediatamente após a mamada.

B) A criança permanece agitada/inquieta durante a mamada.

C) Geralmente, a criança retoma o peso de nascimento após a 2ª semana de vida.

D) Com uma semana de vida, as vezes mantém uma coloração esverdeada.

E) Há prevalência de um padrão de sucção rápido e superficial.

51. (CONCURSO JARDIM/2022) O Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2020) apresenta uma estimativa para o câncer de mama no Brasil, de 66 mil novos



casos por ano. Reconhece-se que, o diagnóstico precoce e o tratamento adequando, conduzem a elevadas taxas de cura. Observe o que se afirma e opte pelo IMPROCEDENTE:

- A) Alcoolismo sustentado (acima de um drink de alto teor alcoólico, diariamente) eleva o risco para câncer de mama em até 10%, segundo pesquisas.
- B) O maior fator de risco para câncer de mama é pertencer ao gênero feminino.
- C) Acredita-se que a origem genética do câncer de mama decorre, em 90% a 95% dos casos, de alterações não familiares.
- D) A literatura aponta que a principal medida de rastreamento seria a mamografia anual após os 40 anos de idade.
- E) Na carcinogênese mamária, os fatores ambientais não merecem destaque. Os fatores familiares são os principais responsáveis pela origem deste tumor.

52. (CONCURSO JARDIM/2022) É fator de risco para o câncer do colo uterino (CCU), EXCETO:

- A) Idade.
- B) Tabagismo.
- C) Multiparidade.
- D) Uso prolongado de contraceptivos hormonais.
- E) Multiplicidade de parceiros sexuais.

53. (CONCURSO JARDIM/2022) O parto é caracterizado pela presença de contrações capazes de provocar dilatação cervical e a expulsão fetal pelo canal parturitivo. Sobre as etapas de modificações contráteis no útero, pode-se afirmar que:

- A) A fase de ativação uterina prepara o útero para o parto.
- B) A fase do trabalho de parto propriamente dito é a ativação.
- C) A fase de quiescência uterina é marcada por importantes alterações cervicais.
- D) A fase de involução uterina é correspondente a fase de expulsão placentária.
- E) As contrações abdominais (puxos maternos) ocorrem na etapa de ativação.

54. (CONCURSO JARDIM/2022) O profissional enfermeiro deve estar atento às peculiaridades para a administração de medicamentos, com especial atenção, para a população pediátrica, a qual possui particularidades quanto à farmacocinética e à farmacodinâmica. Assim, quanto às vias de administração de medicamentos em crianças, pode-se inferir que:

- A) A via retal é preferencial em pediatria, dada à rápida absorção das drogas e baixa interferência na farmacocinética.
- B) A administração venosa, por infusão contínua, é preferencial para a infusão de grandes volumes, sendo que em pediatria, na maioria das vezes, não se requer o uso de bombas infusoras.
- C) Para a administração de fármacos pela via intramuscular, em crianças menores de 7 anos, o músculo deltoide deve ser sempre considerado um local seguro.
- D) A via subcutânea oferece a vantagem de rápida absorção, devendo-se introduzir a agulha em ângulo de 45° a 90°.
- E) A via intradérmica fica limitada a pequenas quantidades, até 0,5 mL em lactentes e crianças pequenas.

55. (CONCURSO JARDIM/2022) A gravidez entre adolescentes continua a representar um problema importante e um desafio para a saúde pública. Dados do Ministério da Saúde apontam para cerca de 430 mil nascidos vivos/ano de mães entre 15 e 19 anos de idade, no Brasil. No que se refere à anti-concepção na adolescência, está INCORRETO:

- A) O uso de contraceptivos hormonais orais combinados está proscrito nessa faixa etária.
- B) A contracepção de longa duração (LARC) possui maiores taxas de adesão entre adolescentes.
- C) Métodos comportamentais devem ser desencorajados nessa faixa de idade.
- D) A orientação de abstinência sexual é alvo de severas críticas, com importantes falhas.
- E) O uso de contracepção de emergência com frequência, também deve ser desencorajado.