



CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTIA

21. (CONCURSO MAURITI/2018) A periodontite crônica é uma doença lentamente progressiva, associada a fatores locais ambientais bem conhecidos. De acordo com seu prognóstico analise os itens abaixo:

1. Em casos nos quais a perda de inserção clínica e perda óssea não são muito avançadas (periodontite leve a moderada), o prognóstico geralmente é bom, contanto que a inflamação possa ser controlada através de uma boa higiene oral e da remoção dos fatores locais e retentivos de biofilme.
2. Em pacientes com periodontite grave, como evidenciado pelo envolvimento avançado de furca e pela mobilidade clínica aumentada, ou em pacientes que não aderem às práticas de higiene oral, o prognóstico pode ser baixado para desfavorável.
3. Pacientes diabéticos, mesmo que compensados, apresentam prognóstico bastante ruim se a periodontite for leve.
4. Pacientes com gengivite associada apenas ao biofilme dental apresentam prognóstico não muito favorável.

Marque a alternativa que apresenta os itens corretos:

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 2, 3, 4
- C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 4

E) 1 e 2

22. (CONCURSO MAURITI/2018) Leia o enunciado da questão:

O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização de artigos. Os artigos são classificados em críticos, semicríticos e não-críticos.

Correlacione as colunas de acordo com a classificação dos instrumentais utilizado na odontologia.

- A. Artigo crítico
- B. Artigo não-crítico
- C. Artigo semi-crítico

- () Cureta McCall 11-12
- () Sonda OMS
- () Espelho para Fotografias extra-bucal
- () Óculos de proteção
- () Jaleco
- () Afastador bucal

- A) A;B;B;C;C;B
- B) B;B;A;A;C;C
- C) B;A;C;B;C;B
- D) A;A;C;B;B;C
- E) C;C;A;B;B;B

23. (CONCURSO MAURITI/2018)

Leia o texto abaixo e responda o que se pede:

Quanto mais os dentistas entenderem as variáveis clínicas e os substratos que podem influenciar a formação de uma



camada híbrida efetiva, maior probabilidade terão de criar adesões resina\dente duradoura. O principal objetivo na adesão ao esmalte\dentina\cimento é a hibridização da estrutura dentaria desmineralizada e a consequente interação dos sistemas adesivos.

Sobre o passo a passo da técnica de uma restauração em resina compostas, marque a alternativa falsa.

- A) O processo de adesão a dentina é um desafio por ser um substrato dinâmico com inúmeras diferenças estruturais e variáveis (composição, fluidos dentinários, gradientes de pressão, variações de permeabilidade, comprimento e diâmetro dos túbulos, graus de calcificação, etc).
- B) Quando um material resinoso é aplicado na superfície do esmalte, condicionada com ácido, os monômeros são levados para dentro das irregularidades por atração capilar, estabelecendo assim, a adesão. O fluxo de penetração dos adesivos nas áreas porosas resulta na formação de "tags" de resina que se unem mecanicamente a resina composta e ao esmalte previamente condicionado.
- C) A secagem excessiva da dentina após o condicionamento poderá acarretar a desidratação das fibras colágenas pela precipitação de proteínas provocando o colapso das mesmas e a consequente formação de espaços vazios, pois o sistema adesivo não conseguirá penetrar.
- D) A *smear layer* oclui os túbulos dentinários e aumento a permeabilidade da dentina em 86%. A camada residual de dentina contém cristais de hidroxiapatita e bactérias.

E) Um aspecto negativo *smear layer* é a sensibilidade pós-operatória e prevenção da penetração bacteriana nos túbulos dentinários, por ser permeável aos produtos bacterianos, que podem resultar em resposta inflamatória do tecido pulpar.

24. (CONCURSO MAURITI/2018) Quanto à terapêutica medicamentosa para prevenção da endocardite infecciosa em pacientes portadores de válvulas cardíacas protéticas e que são alérgicos aos betalactâmicos (penicilinas e cefalosporinas), a alternativa correta é:

- A) Clindamicina oral 600mg iniciada 1 dia antes do tratamento;
- B) Clindamicina oral 600mg iniciada 1 hora antes do tratamento;
- C) Amoxicilina oral 2g iniciada 1 hora antes do tratamento;
- D) Amoxicilina oral 500mg iniciada 1 hora antes do tratamento;
- E) Cefalexina oral 500 mg iniciada 1 hora antes do tratamento.

25. (CONCURSO MAURITI/2018) O diagnóstico Endodôntico é fruto de uma série de informações isoladas, advindas do confronto da queixa principal do paciente com testes clínicos pulpares, perirradiculares, sondagem periodontal e exame radiográfico, além de outros testes complementares.

Sobre o diagnóstico pulpar indique quais as características abaixo se referem a que



patologia pulpar descrita pelos números há seguir:

- 1 - Pulpite reversível
 - 2 - Pulpite irreversível assintomática
 - 3 - Pulpite irreversível sintomática
 - 4 - Necrose pulpar
- () Resposta a testes térmicos negativo em decorrência do canal estar calcificado, onde o aspecto radiográfico apresentam espessamento do espaço do ligamento periodontal, podendo ser identificadas as chamadas lesões perirradiculares.
- () As características desta entidade patológica pode incluir dor aguda após estímulo térmico (demorando a cessar após a remoção do estímulo), dor espontânea (dor não provocada) e dor irradiada (dor reflexa). A resposta á palpação apical e percussão vertical pode ser negativa ou positiva, e o aspecto radiográfico pode se apresentar normal ou ligeiro espessamento do ligamento periodontal.
- () Muitas vezes não há neste caso uma queixa clínica dolorosa importante. Costumam responder normalmente ou de forma bastante moderada aos testes térmicos, podendo ter sofrido agressão ou cárie profunda, cuja remoção leva á exposição da polpa. Quando existe dor costuma ser intermitente (não continua), sobretudo por compressão.
- () Responde positivo para testes térmicos e elétricos, reagindo aos estímulos com resposta dolorosa de intensidade compatível com a excitação provocada. A palpação apical e percussão resulta em resposta negativa.

Assinale a alternativa que indica a sequencia correta:

- A) 4; 2; 3; 1
B) 4; 3; 2; 1
C) 3; 2; 4; 1
D) 3; 1; 4; 2
E) 2; 1; 4; 3

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Os dentes decíduos ou permanentes, para alcançar sua maturidade morfológica ou funcional, passam por um ciclo vital característico bem definido, composta por diversas fases. Durante essas fases do desenvolvimento dentário, podem ocorrer anomalias relacionadas com diversas etiologias, gerando situações que terão importâncias clínicas.

De acordo com o texto, correlacione a coluna 1 com a 2, relatando a sua definição de cada alteração de desenvolvimento, marcando o item que melhor representa.

- 1- Geminação
- 2- Fusão
- 3- Concrecência

- () União entre dois germes independentes.
- () Uma fusão produzida após o início da formação radicular, nessa anomalias os dentes unem-se apenas pelo cimento.
- () Tentativa de divisão de um germe dentário simples por invaginação, fenômeno esse que ocorre durante o estágio de proliferação do ciclo vital dos dentes.



- A) 1;2;3
- B) 2;1;3
- C) 2; 3;1
- D) 3;2;1
- E) 3;1;2

27. (CONCURSO MAURITI/2018) O líquen plano oral, é uma inflamação crônica do revestimento interior da boca que provoca o surgimento de lesões brancas ou avermelhadas muito dolorosas, sendo semelhantes a aftas. Quando surgem manchas na boca e existem suspeitas de líquen plano é aconselhado consultar um dentista para avaliar a possibilidade de ser outro problema. Qual das alternativas não apresentam características e sintomas mais comuns do líquen plano oral:

- A) Manchas esbranquiçadas na boca
- B) Sensação de queimação na boca
- C) Manchas inchadas, vermelhas e dolorosas
- D) Sensibilidade excessiva para comida quente, ácida ou picante
- E) Inflamação periodontal

28. (CONCURSO MAURITI/2018) A importância em conhecer as diferenças anatômicas e fisiológicas entre a criança e o adulto, tem o intuito de estabelecer um padrão de procedimento seguro no uso dos anestésicos locais, incluindo a compreensão suas classificações quanto a

estrutura química e a duração de ação cada um.

De acordo com a estrutura química assinale a alternativa que contenha apenas anestésicos locais do tipo éster.

- A) Benzocaína, mepivacaína, lidocaína e cloroprocaína.
- B) Articaína, benzocaína e bupivacaína.
- C) Articaína, lidocaína, procaína e tetracaína.
- D) Lidocaína, tetracaína, bupivacaína e cloroprocaína.
- E) Benzocaína, procaína, tetracaína e cloroprocaína.

29. (CONCURSO MAURITI/2018) Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF-88), a “Saúde é direito de todos e dever do Estado”. Assim foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que abrange desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. O SUS, em conjunto com as demais políticas, deve atuar na promoção da saúde, prevenção de ocorrência de agravos e recuperação dos doentes. A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da Federação: a União, os Estados e os municípios.

Leia abaixo um dos princípios o qual rege o SUS e assinale o item a qual o representa.

'O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços,



peças não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.'

- A) Integralidade
- B) Universalidade
- C) Equidade
- D) Participação popular
- E) Regionalização

30. CONCURSO MAURITI /2018) Paciente A.M.A, sexo feminino, 14 anos de idade, compareceu ao atendimento de urgência odontológica relatando traumatismo dentário no elemento 11. Na anamnese a paciente relatou que brincava com uma colega e que bate a cabeça no cotovelo dela. Ao exame clínico observou uma redução do nível de exposição da coroa de aproximadamente 2mm em relação ao dente homólogo, além da gengiva marginal edemaciada com pequeno sangramento no sulco gengival. Ao exame radiográfico observamos a rizogênese completa do forame, além de não encontrar danos no periodonto. Qual o diagnóstico e tratamento do dente 11 analisando os aspectos listados acima, assinale a alternativa a qual descreve respectivamente:

- A) Luxação Lateral e Proservação
- B) Luxação Extrusiva e Reimplante dentário
- C) Concussão e Tratamento endodôntico
- D) Luxação Intrusiva e Tracionamento ortodôntico
- E) Avulsão e Contenção rígida

31. (CONCURSO MAURITI/2018) Conhecer a anatomia do periodonto é de fundamental importância para o diagnóstico de alterações nesses tecidos e planejamento de procedimentos cirúrgicos. Sobre anatomia do tecido periodontal é correto afirmar que.

- A) A gengiva livre estende-se a partir da margem gengival em direção apical até a junção mucogengival.
- B) A gengiva inserida é demarcada apicalmente pela ranhura gengival livre.
- C) A área de col é recoberta por um epitélio delgado ceratinizado.
- D) As fibras colágenas predominam no tecido conjuntivo gengival e constituem o mais importante dos componentes do periodonto.
- E) O cemento é um tecido mineralizado ricamente vascularizado e innervado.

32. (CONCURSO MAURITI/2018) A placa bacteriana pode se aderir a superfícies duras naturais da cavidade bucal, como esmalte e a dentina, ou nas superfícies artificiais, como metais e ou resinas. (Lindhe, 2005) Durante a formação da placa é possível ocorrer:

- I. A aderência inicial das bactérias as superfícies sólidas são muito fortes.
- II. As superfícies dentárias são normalmente cobertas por uma fina película adquirida formada por glicoproteínas.



III. Na placa madura a presença de bactérias mortas e que sofreram lise, podem fornecer nutrientes as bactérias ainda viáveis.

IV. O cálculo supragengival tem coloração branco-amarelada ou marrom e sua dureza é moderada.

Sobre a formação da placa as alternativas corretas são:

- A) I, II e III
- B) I, III e IV
- C) II, III e IV
- D) I, II e IV
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

33. (CONCURSO MAURITI/2018) O procedimento de gengivectomia descrito por Goldman em 1951 é empregado até os dias atuais. Para sua execução tem uma sequencia de procedimentos a ser seguido.

1. A incisão inicial deve ser biselada para proporcionar uma margem afilada e adequadamente festonada com lâmina de bisturi 15 ou gengivótomo de Kirkland.
2. O tecido mole interproximal é separado do periodonto interdental por meio de uma segunda incisão.
3. As bolsas vão sendo sondadas e diversos pontos de sangramento vão sendo produzidos na região.

4. Remoção do tecido incisionado e proteção da área com cimento cirúrgico.

A sequencia correta desse procedimento cirúrgico e:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 1, 3, 4, 2.
- C) 3, 1, 2, 4
- D) 2, 3, 1, 4.
- E) 3, 2, 4, 1.

34. (CONCURSO MAURITI/2018) O acesso cirúrgico para raspagem é considerado uma terapia _____ da terapia relacionada à causa. As técnicas cirúrgicas podem facilitar a remoção dos depósitos _____, o controle de placa realizado pelo paciente e promover saúde do periodonto. A escolha da técnica cirúrgica a ser empregada e a região envolvida é feita após _____.

Em sequência os termos que completam corretamente essas lacunas são:

- A) essencial, subgengival, avaliação inicial.
- B) indispensável, supragengival, terapia relacionada à causa.
- C) coadjuvante, subgengival, terapia relacionada à causa.
- D) indispensável, subgengival, avaliação inicial.
- E) coadjuvante, supragengival, diagnóstico da bolsa periodontal.

35. (CONCURSO MAURITI/2018) Associe as duas colunas, relacionando as técnicas de retalho para acesso cirúrgico com suas descrições.



1. Retalho original de Widman
2. Retalho modificado
3. Retalho posicionado apicalmente
4. Retalho de Widman modificado

() Incisão em bisel invertido, o retalho de espessura total deve ser estendido além da linha mucogengival, para possibilitar o reposicionamento apical do tecido mole.

() A incisão inicial é realizada 0,5 a 1mm da margem gengival, paralela ao eixo longitudinal do dente, outras incisões são realizadas para separar o colar de tecido mole da superfície radicular, sem incisão relaxante.

() É determinada por duas incisões relaxantes e uma em bisel invertido, remoção do colar de tecido mole. O tecido mole será suturado na altura da crista óssea alveolar.

() Incisão intrasulcular e remoção do tecido de granulação da bolsa, sem incisão relaxante, permitindo suturar o tecido em sua posição original.

A sequência correta dessa associação é:

- A) 3, 2, 4, 1.
- B) 1, 2, 4, 3.
- C) 4, 3, 1, 2.
- D) 3, 4, 1, 2.
- E) 2, 1, 3, 4.

36. (CONCURSO MAURITI/2018)

I. Acredita-se que o abscesso periodontal seja formado por fechamento ou trauma na entrada da bolsa periodontal.

Porque:

II. Resulta na extensão da infecção da bolsa em direção ao tecido mole da parede da bolsa.

Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que:

- A) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
- B) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
- C) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
- D) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- E) as duas são falsas.

37. (CONCURSO MAURITI/2018) São achados clínicos geralmente observados no abscesso periodontal, exceto:

- A) Dor
- B) Necrose pulpar
- C) Elevação do dente
- D) Mobilidade dentária
- E) Fragilidade na gengiva

38. (CONCURSO MAURITI/2018) A gengivite necrosante é uma condição



inflamatória e destrutiva da _____, caracterizada por ulceração e _____ da papila e da _____ o que resulta em um aspecto característico de _____.

Em sequência os termos que completam corretamente essas lacunas são:

- A) gengiva, necrose, margem gengival, crateras.
- B) crista óssea, inflamação, gengiva inserida, edema.
- C) mucosa alveolar, necrose, gengiva inserida, crateras.
- D) gengiva, inflamação, margem gengival, edema.
- E) crista óssea, necrose, margem gengival, crateras.

39. (CONCURSO MAURITI/2018)
Sobre as doenças periodontais necrosantes, as afirmativas abaixo podem ou não ser verdadeiras. Verifique.

- I. Origem bacteriana.
- II. Acomete gengiva e toda a mucosa bucal.
- III. Após o tratamento permanece a destruição dos tecidos periodontais.

As afirmações I, II e III são, respectivamente,

- A) V, V, V.
- B) V, F, V.

- C) F, F, F.
- D) V, F, F.
- E) F, V, F.

40. (CONCURSO MAURITI/2018)
Edema, vermelhidão e sangramento são características observadas na gengivite devido a alterações vasculares como:

- I. Aumento da permeabilidade.**
- II. Dilatação.**
- III. Pressão hidrostática dentro dos vasos.**

As afirmações I, II e III são, respectivamente,

- A) V, V, V.
- B) V, F, V.
- C) F, F, F.
- D) V, F, F.
- E) F, V, F.

41. (CONCURSO MAURITI/2018)
Paciente do sexo feminino, 26 anos de idade, sem alteração sistêmica, em tratamento ortodôntico, procurou atendimento no PSF com queixa de sangramento durante a escovação. Ao exame clínico foi observado aumento gengival sem perda de inserção e cálculo supragengival no quinto sextante. A conclusão do diagnóstico foi gengivite associada a placa com fator local. O tratamento deve ser:

- 1. Orientação de higiene oral.



2. Reavaliação.
3. Manutenção.
4. Raspagem supragengival.

A sequência correta em que ocorre o processo é

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 3, 2, 4, 1.
- C) 1, 4, 2, 3.
- D) 4, 3, 2, 1.
- E) 2, 1, 4, 1.

42. (CONCURSO MAURITI/2018)

I. Diabetes, gravidez e tabagismo modificam a susceptibilidade, apresentação clínica e progressão da doença periodontal e a resposta ao tratamento.

Porque

II. Alteram a resposta fisiológica, sistema vascular e imune, além da resposta inflamatória e reparo tecidual do hospedeiro.

Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que:

- A) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
- B) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.

- C) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
- D) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- E) as duas são falsas.

43. (CONCURSO MAURITI/2018)
Considere os exames periodontais. As afirmativas abaixo podem ou não ser verdadeiras. Verifique.

- I. A profundidade da bolsa é avaliada através de uma sonda milimetrada, da margem gengival ao fundo da bolsa periodontal.
- II. Nível de inserção é avaliado da junção cimento esmalte até o fundo da bolsa ou do sulco gengival, através de uma sonda milimetrada.
- III. O sangramento a sondagem é observado com uma sonda periodontal pontiaguda.

As afirmações I, II e III são, respectivamente,

- A) V, V, V.
- B) V, F, V.
- C) F, F, V.
- D) V, F, F.
- E) V, V, F.

44. (CONCURSO MAURITI/2018)
Sobre mobilidade dentária é correto afirmar:



- A) Doença periodontal associada a placa não é a única causa do aumento da mobilidade dentária.
- B) A perda de tecidos de suporte não é capaz de causar aumento da mobilidade dentária.
- C) É considerada normal a mobilidade de até 2mm no sentido horizontal.
- D) Na classificação da mobilidade dentária Grau 3 é quando a hiper mobilidade ultrapassa 3mm no sentido vertical.
- E) Do ponto de vista terapêutico, é importante diagnosticar o grau de mobilidade sem se preocupar com a causa.

45. (CONCURSO MAURITI/2018)

I. Várias pesquisas têm demonstrado que a manutenção da saúde periodontal, após o tratamento ativo, é mantida por longos períodos quando o paciente realiza Terapia Periodontal de Suporte (TPS).

Porque:

II. A determinação do intervalo entre as consultas da TPS pode ser baseada na avaliação de risco do paciente.

Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que:

- A) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
- B) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
- C) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.

- D) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- E) as duas são falsas.

46. (CONCURSO MAURITI/2018) A clorexidina é considerada padrão ouro no controle químico na periodontia. Sobre essa substância é correto afirmar:

- A) A concentração de 2% é a ideal para o uso como enxaguatório bucal.
- B) Efeitos colaterais como manchamentos dos dentes e no dorso da língua são raramente relatados, mesmo quando o uso é por longos períodos.
- C) Sua baixa substantividade, em média de 3horas, é a sua maior desvantagem.
- D) A alta penetrabilidade do antisséptico permite melhores resultados como agente terapêutico que preventivo.
- E) Usada em pós operatório pois, reduz a carga bacteriana da cavidade oral e previne a formação de placa no momento em que a limpeza mecânica pode ser difícil devido ao desconforto.

47. (CONCURSO MAURITI/2018) Trauma de oclusão é um dos termos usados para descrever as alterações patológicas ou adaptativas do periodonto decorrente de força excessivas da oclusão. Sobre esse tema avalie as sentenças abaixo:

- I. Lesão de trauma de oclusão é frequentemente dividido em primário e secundário.



II. Quando o periodonto está severamente reduzido, forças normais ou até reduzidas podem causar danos ou adaptações no periodonto.

III. Em dentes com periodontite, o trauma de oclusão pode, sob certas condições, aumentar a velocidade de progressão da doença.

IV. Mobilidade dentária é citada constantemente como um sinal clínico do trauma oclusal.

As afirmações I, II, III e IV são, respectivamente,

A) V, V, V, V.

B) V, F, V, F.

C) F, F, V, V.

D) V, F, F, V.

E) V, V, F, F.

48. (CONCURSO MAURITI/2018) As curetas Gracey são também conhecidas como curetas específicas. Considerando esses instrumentais avalie as afirmativas abaixo.

I. Essas curetas são provavelmente os melhores instrumentos para raspagem subgingival e alisamento radicular, porque oferecem boa adaptação à anatomia radicular complexa.

II. As curetas Gracey 5-6 são indicadas para raspagem de todas as faces dos dentes anteriores e faces livres de pré-molares.

III. A lâmina dessas curetas são anguladas em 90° com a haste inferior.

IV. A lâmina curva-se em dois planos; para cima e para o lado.

As afirmações I, II, III e IV são, respectivamente,

A) V, V, V, F.

B) V, F, V, F.

C) F, F, V, V.

D) V, V, F, F.

E) V, V, F, V.

49. (CONCURSO MAURITI/2018) Os procedimentos cirúrgicos de aumento de coroa são amplamente executados em periodontia. Sobre esse procedimento é correto afirmar:

I. Favorece a forma de retenção a fim de permitir preparos dentários, moldagem e tratamentos restauradores, além de ajuste na margem gengival para fins estéticos.

II. É indicado caso haja violação do espaço biológico pois, ocorrerá inflamação gengival, formação de bolsa e perda óssea alveolar. Assim, é recomendado o procedimento para que devolva um espaço de pelo menos 3mm entre a margem do preparo.

III. Para realização desse procedimento pode incluir a remoção apenas de tecido mole ou tanto de tecido mole e osso alveolar.



IV. A redução do tecido mole isoladamente é indicada mesmo quando não há gengiva inserida adequada.

As afirmativas verdadeiras são:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

50. (CONCURSO MAURITI/2018) A fase I da terapia periodontal tem como objetivo modificar ou eliminar os fatores etiológicos microbianos e os fatores que contribuem para as doenças gengivais e periodontais.

Nessa fase alguns procedimentos fazem parte como:

- I. Instrução de higiene oral.
- II. Clareamento dental.
- III. Raspagem supragengival e subgengival.
- IV. Recontorno de restaurações e próteses defeituosas.
- V. Movimentação ortodôntica.

Os procedimentos que realmente fazem parte dessa fase são:

- A) I, III, IV e V.
- B) I, II, III e IV.

C) I, II, III e V.

D) II, III, IV e V.

E) I, IV e V.