



15. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A primeira comemoração da maior festa religiosa de Porteiras ocorre em 1934, realizada pela Professora Maria do Carmo Simplício. Em reconhecimento ao feito, em 2005 a cidade homenageou a professora:

- A) Nomeando a principal avenida da cidade com o nome de Professora Maria do Carmo Simplício;
- B) Estabelecendo o aniversário da Professora Maria do Carmo Simplício como feriado municipal;
- C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e nomeando-a de Biblioteca Professora Maria do Carmo Simplício;
- D) O município criou em 2005 a Escola Profissionalizante Professora Maria do Carmo Simplício em homenagem a primeira realizadora da maior festa religiosa da cidade;
- E) O município de Porteiras criou em 2005 o museu Professora Maria do Carmo Simplício.

DENTISTA

16. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia. De acordo com este documento constituem infrações éticas, EXCETO

- A) Intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional, ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, sempre fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito.
- B) Considerar na fixação dos honorários profissionais fatores como condição sócio-econômica do paciente, conceito do profissional e a cooperação do paciente durante o tratamento.
- C) Negar, na qualidade de profissional assistente, informações odontológicas consideradas necessárias ao pleito da concessão de benefícios previdenciários ou outras concessões facultadas na forma da Lei, sobre seu paciente, seja por meio de atestados, declarações, relatórios, exames, pareceres ou quaisquer outros documentos probatórios, desde que autorizado pelo paciente ou responsável legal interessado.
- D) Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, exceto em casos de urgência ou emergência
- E) Executar procedimentos como técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese



dentária, além daqueles discriminados na Lei que regulamenta a profissão e nas resoluções do Conselho Federal de Odontologia.

17. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O Índice CPO-D é largamente utilizado no âmbito dos levantamentos epidemiológicos em Saúde Bucal. Sobre ele podemos afirmar CORRETAMENTE que:

- A) A letra D do acrônimo utilizado na denominação do índice refere-se a “dentes examinados”, para diferenciar este indicador de outro que trata de “superfícies dentárias examinadas” (CPO-S).
- B) É obtido mediante exame da coroa e raiz do dente, permitindo incluir as cáries radiculares.
- C) Informa sobre o ataque da cárie, retratando e diferenciando a etiologia das perdas dentais, como motivadas por doença periodontal, por motivos protéticos ou por razões ortodônticas.
- D) É um levantamento epidemiológico eficiente no que diz respeito ao diagnóstico pois proporciona uniformidade de interpretações dos estágios iniciais da cárie, por parte dos examinadores, evitando subestimação do índice quando cáries de esmalte deixam de ser consideradas.
- E) O método do cálculo do índice CPO-D consiste na razão entre o número total de dentes permanentes cariados (incluindo neste componente os dentes com extração indicada), perdidos e obturados em crianças examinadas, de 12 anos de idade, e o número de crianças residentes examinadas, de 12 anos de idade.

18. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O primeiro contato é crucial e deve ser um encontro atencioso entre paciente e profissional, onde este deve direcionar todo esforço para que se estabeleça uma comunicação harmoniosa e verdadeira, fazendo com que o paciente se sinta foco de interesse do profissional. É ainda uma oportunidade para praticar o cuidado de forma holística, contribuindo para a prevenção de agravos e colaborando com o diagnóstico de alterações na região anatômica de atuação profissional do Cirurgião-dentista. Desta forma, no que se refere ao exame extra-bucal, assinale apenas a alternativa INCORRETA:

- A) Os olhos deveriam ser examinados buscando características como vermelhidão, perceptível no trauma, em doenças oculares ou na Síndrome de Sjögren.
- B) Na inspeção do pescoço, deve ser observado particularmente o aumento de volume ou abscesso, seguido por uma palpação cuidadosa de todos os linfonodos cervicais, glândulas salivares e tireóide, pesquisando aumento de volume ou sensibilidade.
- C) O pescoço é melhor examinado observando o paciente de frente, verificando alguma assimetria ou tumefação evidente, depois posicionando-se atrás do paciente sentado para apalpar os linfonodos.
- D) Os linfonodos submentonianos superficiais são examinados suavemente com os dedos, pois eles somente podem ser comprimidos contra o músculo esternocleidomastóideo, uma estrutura macia. Já os linfonodos cervicais são examinados inclinando-se a cabeça do paciente para frente e deslizando os dedos contra a parte interna da mandíbula.



E) Os linfonodos submandibulares devem ser examinados com a cabeça do paciente inclinada para o lado o qual está sendo investigado. Há necessidade de se diferenciar glândula submandibular de linfonodos submandibulares. A palpação bimanual com um dedo no soalho da boca pode auxiliar.

19. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A dor que se origina no periodonto é mais prontamente localizada do que a dor pulpar. A melhor capacidade de localizar a fonte da dor pode ser atribuída à sensibilidade proprioceptiva e mecanoceptora do periodonto, que se encontra ausente na polpa. Embora a localização do dente afetado seja freqüentemente precisa, em até metade dos casos a dor é difusa e irradia-se para o osso gnático onde está o dente afetado. Sobre este tipo de dor, podemos afirmar que está INCORRETA a alternativa:

- A) Costuma estar associada ao desconforto ocasionado pela pressão no dente afetado e em geral não é agravada por calor nem frio.
- B) Durante o exame do dente afetado, este é prontamente localizado por meio de percussão dentária.
- C) É espontânea na fase inicial, de intensidade moderada a grave, persiste por períodos longos de tempo (horas), e é exacerbada pela mastigação com o dente afetado e, em casos mais avançados, mesmo ao fechar a boca e colocar o dente afetado suavemente em contato com os dentes antagonistas. Nesses casos, há a sensação de que o dente está “crescido” (extruído) e é muito sensível ao toque.

D) Geralmente é melhor tolerada do que as dores paroxísticas e insuportáveis da pulpite, pode ser associada com sensibilidade à palpação na região vestibular/periapical com precisão, e o paciente é capaz de indicar o dente afetado.

E) Geralmente é associada com um dente com vitalidade pulpar e associada com sensibilidade à palpação na região cervical.

20. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) As lesões bucais vermelhas são comuns e, usualmente, causadas por inflamação como ,por exemplo, infecções nas mucosas como a candidíase. Entretanto, estas lesões podem ser perigosas e significar uma displasia severa ou uma neoplasia maligna. Quanto aos tipos de lesões vermelhas, assinale apenas a alternativa INCORRETA:

- A) Lesões exofíticas
- B) Lesões focais
- C) Lesões multifocais
- D) Lesões discóides
- E) Lesões difusas

21. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre os tipos de materiais dentários, quanto ao seu uso, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Materiais dentários preventivos correspondem a cimentos, materiais aplicados em uma camada fina para selar fósulas e fissuras, ou material restaurador que libera um agente terapêutico com flúor e /ou íons mineralizadores para prevenir ou



interromper a desmineralização da estrutura dentária.

- B) Materiais dentários restauradores podem ser substâncias metálicas, cerâmicas, metalocerâmicas ou resinosas, usadas para substituir, reparar ou reconstruir dentes ou melhorara a estética.
- C) Materiais restauradores diretos são cimentos, metais ou compósitos de base resinosa, que são inseridos e conformados intra ou extra-oralmente para restaurar ou melhorar a estética de elementos dentais.
- D) Materiais restauradores indiretos são cerâmicas, metais ou materiais metalocerâmicos, bem como resinas compostas, usadas extra-oralmente para produzir próteses, cujos objetivos sejam melhorar a estética e/ou restaurar dentes danificados .
- E) Materiais restauradores provisórios são cimentos ou materiais resinosos utilizados por um período que pode variar entre poucos dias até vários meses, com o objetivo de restaurar ou substituir dentes ou estrutura dentária perdida até que uma prótese ou restauração possa ser confeccionada.

22. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Na confecção de restaurações em amálgama dental, as etapas operatórias são relevantes para o desempenho clínico da mesma. Considerando a etapa de condensação, assinale a assertiva CORRETA:

- A) A exigência mais importantes da técnica de condensação é que o mínimo de excesso de mercúrio seja removido para que a restauração final não seja porosa.

- B) São componentes importantes da condensação o uso da força máxima, o uso de condensadores de tamanho adequado em relação ao tamanho da cavidade, e o uso de porta-amálgamas eficientes.
- C) Embora em geral sejam recomendadas pressões de condensação de 5-9 N, pressões menores de condensação fornecerão um resultado mais eficiente.
- D) A colocação de pequenos incrementos não só levará à formação de grandes quantidades de γ_1 e γ_2 , mas também produzirá alto nível de porosidade.
- E) A condensação dos amálgamas de liga esférica e dos sistemas de partículas tipo limalha requer abordagem idêntica quanto à alta pressão de condensação e uso de condensadores de pequeno diâmetro.

23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A dentina é um substrato dental cujas peculiaridades interferem no desempenho de restaurações adesivas em resina composta. Considerando as assertivas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa que representa a sequência correta:

- () A dentina é composta de aproximadamente 70% de matéria inorgânica, 20% de material orgânico e 10% de água por peso. O material inorgânico é principalmente a hidroxiapatita, e o material orgânico é predominantemente colágeno.
- () Um aspecto característico da dentina é o arranjo dos túbulos dentinários que atravessam toda a espessura. A presença desses túbulos torna a dentina permeável às drogas, substâncias químicas e toxinas, que podem se difundir pela dentina e lesionar polpa.



- () A composição heterogênea da dentina torna-a um substrato particularmente fácil para união com um adesivo.
- () A pressão diferencial entre esmalte e o soalho dentinário causa o bombeamento do fluido para fora dos prismas, o que facilita a criação de uma superfície dentinária seca. A secagem vigorosa de esmalte e dentina são preconizadas, com cautela.
- A) V, V, F, F
B) V, F, F, V
C) V, F, V, F
D) F, F, V, V
E) F, V, F, V

24. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A radiografia panorâmica (também chamada de pantomografia) é uma técnica que produz uma única imagem tomográfica das estruturas faciais que inclui ambos os arcos dentários, maxilar e mandibular, e suas estruturas de suporte. Radiografias panorâmicas são mais úteis clinicamente para o diagnóstico de problemas que requerem ampla visualização dos maxilares. Exemplos comuns incluem, EXCETO:

- A) Avaliação de traumatismo dentoalveolar.
B) Localização de terceiros molares.
C) Avaliação do desenvolvimento das arcadas dentais, em especial na dentição mista.
D) Investigação de anomalias de desenvolvimento craniofaciais.
E) Diagnóstico de cárie interproximal.

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). São fundamentos e/ou diretrizes da Atenção Básica:

- A) Adscrição do território.
B) Acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
C) Zelo pela igualdade e uniformidade de ações voltadas ao usuário.
D) Estímulo à participação de usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e da coletividade.
E) Coordenação da integralidade em seus vários aspectos.

26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) É dever de todo profissional de saúde da rede pública, conveniada ou privada comunicar à autoridade sanitária mais próxima todos os casos suspeitos de doenças de notificação compulsória que compõem a lista brasileira, independente de sua confirmação diagnóstica, bem como as que foram acrescentadas nos âmbitos estaduais e municipais. Sendo assim, assinale abaixo apenas a alternativa composta por doenças ou agravos de notificação compulsória:

- A) Hepatites virais e infecção por Epstein-Barr.



- B) Acidente de trabalho com exposição a material biológico, e toxoplasmose gestacional e congênita.
- C) Violência doméstica e/ou outras violências, e Síndrome da Paralisia Flácida Aguda.
- D) Leptospirose e Intoxicação Exógena por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados.
- E) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus e Influenza humana produzida por novo subtipo viral

27. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A respeito do Cementoblastoma, a assertiva INCORRETA é:

- A) Consiste numa neoplasia odontogênica benigna.
- B) É caracterizado pela proliferação de tecido mineralizado de origem cementária unido à raiz de um ou mais elementos dentários.
- C) Em geral, acomete pacientes jovens na segunda e na terceira décadas de vida, sem predileção por gênero.
- D) A maxila posterior é a região de predileção e o canino superior é o dente mais associado ao desenvolvimento destas lesões.
- E) Ao contrário da grande maioria dos tumores odontogênicos, os cementoblastomas apresentam dor associada em cerca de 50% dos casos.

28. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Estratégias terapêuticas baseadas nos fatores de risco de um indivíduo à cárie são padrão-ouro do tratamento minimamente invasivo. Isso significa que é imperativo determinar o risco de cárie

antes de decidir produtos e métodos preventivos a serem recomendados. Isso pode ser conseguido considerando os seguintes aspectos, EXCETO:

- A) Presença de lesões de mancha branca e exposição ao flúor.
- B) História de cárie individual e familiar, e situação socioeconômica.
- C) Etnia, dieta e história médica.
- D) Qualidade do fluxo salivar e presença de defeitos de desenvolvimento no esmalte.
- E) Higiene bucal e competência músculo-esquelética mastigatória.

29. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Julgue as assertivas abaixo como Verdadeira (V) ou Falsa (F), e a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, a respeito das características das lesões de cárie induzidas por mamadeira:

- () Esse padrão de cárie não ocorre com amamentação de peito prolongada.
- () A cárie de mamadeira pode também ser causada pela sucção não nutritiva ou artificial.
- () São lesões de cárie com crescimento descontrolado que afetam os dentes superiores anteriores, e aparecem depois nos dentes posteriores, tanto nos primeiros molares decíduos inferiores quanto nos superiores.
- () Os caninos são menos afetados do que os primeiros molares por causa da erupção tardia, e os dentes anteriores inferiores não são afetados. Acredita-se que isso se deva ao fluxo salivar e à posição da língua.

A) F,F,V,F



- B) F,F,V,V
- C) V,F,V,F
- D) V,V,V,F
- E) F,F,V,V

30. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O flúor é largamente empregado na prevenção da cárie dental, e a redução deste agravo em Saúde Bucal atribuída ao uso do flúor tem sido uma das maiores conquistas da Saúde Pública. A respeito do mecanismo de ação do flúor, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Atua, predominantemente, de modo tópico como fenômeno pós-eruptivo, promovendo a remineralização e reduzindo a desmineralização.
- B) Cálcio e o fosfato precisam estar presentes em solução para promover a remineralização, mediada pela presença de flúor tópico.
- C) O flúor possui efeito na via glicolítica de micro-organismos bucais, reduzindo a produção de ácido e influenciando na regulação enzimática do metabolismo dos carboidratos.
- D) Entre os materiais odontológicos que disponibilizam flúor em sua composição podemos citar o Cimento de Ionômero de Vidro e o Verniz fluoretado.
- E) Com a aplicação de flúor tópico concentrado, como dentifrícios, a formação de fluoreto de cálcio é favorecida.

31. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A respeito do fosfato de flúor acidulado (FFA), contendo 12.300 ppm F (1,23% de

FFA, 1,23% w/v F), considere as assertivas a seguir e assinale a alternativa que apresenta apenas conceitos e informações corretas:

- I - Consiste na mistura de fluoreto de sódio, ácido fluorídrico e ácido ortofosfórico, e são limitados ao uso profissional;
 - II- A incorporação do polímero solúvel em água (celulose de carboximetil de sódio) produz no FFA aquoso uma solução viscosa que melhora e facilita a aplicação fazendo-se uso de moldeiras.
 - III- Géis tixotrópicos quando aplicados com moldeiras fluem sob pressão, facilitando a penetração do gel entre os dentes.
- A) III.
 - B) I e II.
 - C) I e III.
 - D) II e III.
 - E) I, II e III.

32. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre os materiais restauradores utilizados em Odontopediatria, e considerando a correta relação entre material e desvantagem (material/desvantagens) apresentada pelo mesmo, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Amálgama / Apresenta risco ocupacional.
- B) Cimento de Ionômero de Vidro modificado por Resina / Sofre absorção de água.
- C) Resinas compostas / Necessita de preparo cavitário extenso.
- D) Cimento de Ionômero de vidro / É susceptível à erosão e desgaste.



E) Coroa de aço inoxidável / Não apresenta boa estética.

33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) No que tange à terapia pulpar para dentes decíduos e permanentes imaturos, podemos afirmar CORRETAMENTE que:

- A) As pequenas exposições da polpa tem origem cariiosa, e podem ser do tipo mecânica ou iatrogênica.
- B) O capeamento pulpar direto não é indicado para dentes permanentes imaturos.
- C) O tamanho da exposição pulpar afeta diretamente o prognóstico.
- D) Para a dentição decídua, o tratamento das exposições pulpares com melhor prognóstico é a pulpotomia.
- E) Em virtude do uso de substâncias antimicrobianas na limpeza da cavidade, exposições pulpares por cárie tem prognóstico tão favorável quanto aquelas de etiologia mecânica.

34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O formocresol é utilizado na Odontologia há mais de 100 anos, tendo sua eficácia estudada extensivamente, com grandes taxas de sucesso clínico. Sobre o seu uso, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O componente formaldeído do formocresol apresenta robusta ação bactericida e inibe de modo irreversível diversas enzimas no processo inflamatório.
- B) Em sua origem, o objetivo da utilização do formocresol era mumificar (fixar) completamente todo o tecido pulpar residual e o material necrótico no interior do canal

radicular. Técnicas atuais, contudo, objetivam criar uma camada de fixação bem superficial, ao mesmo tempo que preserva a vitalidade da polpa radicular mais profunda.

- C) O formocresol é aplicado no local da pulpotomia com o auxílio de seringa do tipo Luer, em quantidade suficiente para preencher o preparo cavitário.
- D) O formocresol somente deve ser aplicado no local da pulpotomia depois que a hemostasia tiver sido alcançada, jamais devendo ser aplicado sobre o tecido em sangramento.
- E) O uso do formocresol na Odontologia está inserido nos atuais limites de exposição permitidos, e nos limites de exposição de curto prazo do formaldeído.

35. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O tratamento dos traumatismos dentoalveolares em crianças é angustiante tanto para a criança quanto para seu responsável e, frequentemente, difícil para o dentista. O traumatismo não só compromete uma dentição até então saudável, como também pode ocasionar um déficit que afeta a autoestima e a qualidade de vida, além de submeter o paciente a uma vida de tratamentos odontológicos permanentes. Sobre os traumatismos dentais, podemos afirmar CORRETAMENTE que são fatores predisponentes:

- A) Uso de aparelho ortodôntico fixo.
- B) Má oclusão de Classe II divisão 1.
- C) Má oclusão de Classe I.
- D) Sobressaliência entre 1-3 mm.
- E) Uso de dispositivos de sucção não-nutritiva.



36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Ao atender um paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica que precisa de intervenção cirúrgica para exodontia múltipla (elementos 25, 26 e 27) é recomendado, EXCETO:

- A) Usar um protocolo de redução de ansiedade, mas evitar o uso de depressores respiratórios.
- B) Se o paciente necessita de suplementação crônica de oxigênio, continuar como prescrito em fluxo lento.
- C) Se o paciente não necessitar de tratamento com oxigênio suplementar, consultar o médico antes de administrar oxigênio.
- D) Se o paciente faz uso crônico de corticosteróides, tratá-lo como se fosse um paciente com insuficiência suprarrenal.
- E) Agendar o paciente para o período da manhã, para permitir maior eliminação de secreções.

37. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Embora não seja um estado de doença, a gravidez é uma situação que merece considerações especiais quando uma cirurgia oral é necessária. Entre as assertivas abaixo, assinale apenas a que não representa precaução recomendada, quando não houver possibilidade de adiamento do procedimento cirúrgico:

- A) Utilizar lidocaína, prilocaína ou articaína como anestésicos de escolha, em dose adequada.
- B) No caso dos exames por imagem, o uso de aventais de proteção e a realização de radiografias com filmes periapicais digitais unicamente nas áreas que sofrerão a cirurgia diminuem os riscos.

- C) Embora a aspirina possa ser utilizada com segurança, ela não deve ser administrada no último trimestre de gravidez devido às suas propriedades anticoagulantes.
- D) Paracetamol constitui a melhor opção como analgésico não-opióide, em quantidade moderada.
- E) Penicilinas e cefalosporinas são recomendados como fármacos antimicrobianos, em adequado regime terapêutico.

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) É considerada uma emergência de acometimento sistêmico do paciente, comumente desencadeadas pela ansiedade durante o atendimento odontológico, EXCETO:

- A) Crise tireoideana.
- B) Choque insulínico.
- C) Teleangectasia.
- D) Broncoespasmo asmático.
- E) Insuficiência suprarrenal (aguda).

39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São lesões ou patologias gengivais induzidas por placa:

- A) Eritema gengival linear
- B) Fibromatose gengival hereditária
- C) Gengivite associada a contraceptivos orais
- D) Líquen plano
- E) Penfigoide



40. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os fatores sistêmicos que contribuem para a gengivite são, EXCETO:

- A) alterações endócrinas associadas à puberdade
- B) hipertensão
- C) gravidez
- D) diabetes
- E) leucemia

41. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A periodontite crônica pode ser subclassificada nas formas localizada e generalizada e caracterizada como leve, moderada ou grave, baseada nas características em comum descritas anteriormente e nas seguintes características específicas, EXCETO:

- A) Forma localizada: < 30% dos sítios envolvidas.
- B) Forma generalizada: > 30% dos sítios envolvidas.
- C) Leve: 1 a 2mm de perda de inserção clínica.
- D) Moderada: 2 a 5mm de perda de inserção clínica.
- E) Grave: \geq 5mm de perda de inserção clínica.

42. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A gengivite pode ter início súbito e curta duração, podendo ser dolorosa, ou ainda ter uma apresentação mais branda. Em casos individuais é descrita pela combinação de termos. Assim, assinale a alternativa que apresente a CORRETA

combinação de termos e conceito associado:

- A) A gengivite cervical localizada é confinada a uma ou mais áreas da gengiva marginal.
- B) A gengivite difusa focalizada se estende a partir da margem da prega mucobucal, em uma área limitada.
- C) A gengivite interdental localizada é confinada a um ou mais espaços interdentários, em uma área limitada.
- D) A gengivite marginal difusa envolve as margens gengivais relacionadas com todos os dentes. As papilas interdentárias geralmente são afetadas.
- E) A gengivite difusa generalizada envolve toda a gengiva, afetando mucosa alveolar e a gengiva inserida.

43. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os anestésicos locais, quando utilizados para o controle da dor, diferem de maneira importante da maioria das outras substâncias comumente utilizadas na Odontologia. Quanto a esta afirmação, é FALSA apenas:

- A) As velocidades em que os anestésicos locais são absorvidos para a corrente sanguínea e alcançam seu nível sanguíneo máximo não sofrem variação de acordo com a via de administração.
- B) Os anestésicos locais, quando utilizados para o controle da dor, deixam de exercer efeito clínico quando são absorvidos do local de administração para a circulação.
- C) Um fator primordial envolvido no término da ação de anestésicos locais utilizados para o controle da dor é sua redistribuição da fibra nervosa para o sistema cardiovascular.



D) Um efeito clínico significativo da vasodilatação é um aumento da velocidade de absorção do anestésico local para a corrente sanguínea, diminuindo, assim, a duração e a qualidade do controle da dor e aumentando a concentração sanguínea do anestésico e o potencial de superdosagem.

E) Praticamente todos os fármacos, independentemente da via pela qual são administradas, precisam entrar no sistema circulatório em concentrações suficientemente altas para poder começar a exercer uma ação clínica.

44. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Várias complicações potenciais estão associadas à administração de anestésicos locais. Por questões de conveniência, essas complicações podem ser divididas entre as que ocorrem localmente na região da injeção e as sistêmicas. Entre aquelas que ocorrem localmente, podemos citar, EXCETO:

- A) Parestesia ou anestesia prolongada
- B) Paralisia de nervo facial
- C) Anafilaxia
- D) Trismo
- E) Edema

45. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A adesividade aos tecidos dentais é uma estratégia de grande relevância para as restaurações estéticas em Odontologia, e os mecanismos a partir dos quais é possível a criação de uma interface adesiva entre substrato dental e material

restaurador devem ser de conhecimentos do cirurgião dentista. Assim sendo, podemos afirmar que os fatores que governam a capacidade de um adesivo estar em contato íntimo com o substrato são:

- A) rugosidade de superfície, viscosidade do adesivo e molhamento do substrato pelo adesivo.
- B) forma de retenção do preparo cavitário, molhamento do substrato e ângulo de contato entre adesivo e superfície.
- C) viscosidade do adesivo, confecção de bisel no ângulo cavo superficial do preparo cavitário e forma de retenção.
- D) Molhamento do substrato, remoção de *smear layer* e formação de camada híbrida.
- E) Viscosidade do adesivo, desmineralização uniforme superficial expondo prismas de esmalte e formação da camada híbrida.